3.11.05

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

РЕЛИФ АДВАНС

Регистрационный номер:

Торговое название: Релиф Адванс
Лекарственная форма: мазь для ректального и наружного применения

Состав
Действующие вещества: масло печени акулы 30 мг/1 г (3%), бензокаин 200 мг/ 1 г (20%).
Вспомогательные вещества: масло минеральное, вазелин, пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен, сорбитан моностеарат.

Описание: однородная мазь белого цвета с желтоватым оттенком, со слабым своеобразным запахом, не содержащая посторонних включений.

Фармакотерапетическая группа: противогеморроидальное средство.

Код АТХ: С05АХ

Фармакологические свойства.
Масло печени акулы оказывает местное противовоспалительное, гемостатическое, ранозаживляющее и иммуномодулирующее действие.
Бензокаин оказывает местноанестезирующее действие.

Показания к применению.
Наружный и внутренний геморрой, эрозии, трещины заднего прохода, анальный зуд. Применяется в качестве обезболивающего средства после проктологических операций, при проведении диагностических манипуляций.

Противопоказания.
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения.

Способ применения и дозы.
Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожнения кишечника.
После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок.
Детям до 12 лет применять только по рекомендации врача.

Побочное действие.
Аллергические реакции, местные реакции (гиперемия, зуд).

Передозировка.
Симптомы передозировки могут быть связаны с фармакологическими эффектами бензокаина. Его системная абсорбция при передозировке может проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением, в тяжелых случаях – судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию, которая проявляется дыхательными расстройствами и цианозом. Внутривенное введение метиленового синего является специфическим средством в лечении этого состояния.
В случае значительного превышения рекомендованных разовых и суточных доз масла печени акулы может наблюдаться склонность к ускорению свертывания крови.

Особые указания.
При обильных кровянистых выделениях из заднего прохода или при сохранении болезненных симптомов свыше 7 дней необходимо дополнительно проконсультироваться с проктологом.

Применение при беременности и в период лактации.
Беременным женщинам и кормящим матерям препарат необходимо назначать с осторожностью, в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Форма выпуска: По 28,4 г в пластиковую тубу. Туба вместе с аппликатором и инструкцией по медицинскому применению помещена в картонную пачку, обтянутую полиэтиленовой пленкой.

Условия хранения.
В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 27°С.

Срок годности.
2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.
Без рецепта.

Производитель. Сагмел, Инк., Чикаго, США
1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048.
Представительство в России:
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7
Тел.: (095) 937-40-73, 937-40-80 факс (095) 937-40-83

Директор ИДКЭЛС
Профессор В.В.Чельцов

Управляющий А.К. Гололобов