МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Релиф® Адванс

наименование лекарственного препарата

мазь для ректального и наружного применения 200 мг/г

лекарственная форма, дозировка

ФАМАР С.А., Греция

наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 050717 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожнения кишечника. После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Детям до 12 лет применять только по рекомендации врача.	**Способ применения и дозы** Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожнения кишечника в течение 7-10 дней. После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Детям до 12 лет применять только по рекомендации врача. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

105518

Старая редакция	Новая редакция
	Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.
Побочное действие Аллергические реакции, местные реакции (гиперемия, зуд).	**Побочное действие** Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих бензокаин, в различных условиях. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата. *Нарушения со стороны иммунной системы* Аллергические реакции. *Нарушения со стороны крови и лимфатической системы* Метгемоглобинемия. *Общие расстройства и нарушения в месте введения* Эритема, местное раздражение, отек, боль, сыпь в месте применения. *Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей* Аллергический дерматит. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Особые указания При обильных кровянистых выделениях из заднего прохода или при сохранении болезненных симптомов свыше 7 дней необходимо дополнительно проконсультироваться с прок-	**Особые указания** При обильных кровянистых выделениях из заднего прохода или при сохранении болезненных симптомов свыше 7 дней необходимо дополнительно проконсультироваться с прок-

Старая редакция	Новая редакция
тологом.	тологом. Имеются сообщения о том, что продукты, содержащие бензокаин, могут вызывать метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз кожи, губ и ногтей, головная боль, головокружение, одышка (затруднение дыхания), слабость, тахикардия, которые наблюдаются во время лечения, могут свидетельствовать о потенциально опасной для жизни метгемоглобинемии, которая требует немедленной медицинской помощи. В целях минимизации системных побочных эффектов не превышать рекомендуемую суточную дозу, если иное не предписано врачом. Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание снижения их эффективности. Не рекомендуется применять препарат на поврежденной коже, так как это может повысить системную абсорбцию. **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Не влияет.

Менеджер по регистрации Олейник Е.Ф.

АО «БАЙЕР» АО BAYER

МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000012 ФГБУ НЦЭСМП

105518