

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Виканол® Лайф

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Регистрационный номер: № ЛП-004459

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «22» 05 20119 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Препарат принимают внутрь. <u>Взрослым и детям старше 12-ти лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, обед и ужин) и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 8 до 12 лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 4 до 8 лет</u> назначают в дозе 8 мг/кг/сутки; в зависимости от массы тела ребенка назначают по 1-2 таблетки в сутки (соответственно, в 1-2 приёма в сутки). При этом суточная доза должна быть наиболее близка к расчетной дозе (8 мг/кг/сутки). Препарат принимают за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством воды. Не	Способ применения и дозы Препарат принимают внутрь. <u>Взрослым и детям старше 12-ти лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, обед и ужин) и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 8 до 12 лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 4 до 8 лет</u> назначают в дозе 8 мг/кг/сутки; в зависимости от массы тела ребенка назначают по 1-2 таблетки в сутки (соответственно, в 1-2 приёма в сутки). При этом суточная доза должна быть наиболее близка к расчетной дозе (8 мг/кг/сутки). Препарат принимают за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством воды. Не

Старая редакция	Новая редакция
рекомендуется запивать таблетки молоком. Продолжительность курса лечения 4-8 недель. В течение следующих 8 недель не следует применять препараты, содержащие висмут (например, Викаир, Викалин). Для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> целесообразно применение препарата в комбинации с другими антибактериальными средствами, обладающими антихеликобактерной активностью (по рекомендации врача).	рекомендуется запивать таблетки молоком. Продолжительность курса лечения 4-8 недель. В течение следующих 8 недель не следует применять препараты, содержащие висмут (например, Викаир, Викалин). Для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> целесообразно применение препарата в комбинации с другими антибактериальными средствами, обладающими антихеликобактерной активностью (по рекомендации врача).
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг. По 8, 10, 15, 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 24 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 30, 60, 120, 240 таблеток в банки полимерные полиэтиленовые для хранения лекарственных средств и витаминов в комплекте с крышками полимерными полиэтиленовыми или в банки полимерные полиэтиленовые с контролем первого вскрытия и амортизатором. 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг. По 8 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 4, 7, 14 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 3, 6, 12, 24 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 4, 8 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 3, 6, 12 контурных ячейковых упаковок вместе с

Старая редакция	Новая редакция
	инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 30, 60, 120, 240 таблеток в банки полимерные полиэтиленовые для хранения лекарственных средств и витаминов в комплекте с крышками полимерными полиэтиленовыми или в банки полимерные полиэтиленовые с контролем первого вскрытия и амортизатором. 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Владелец Регистрационного Удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115, Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18.	Владелец Регистрационного Удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия, 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18.

Генеральный директор
ООО НПО «ФармВИЛАР»



К.Ю. Калиниченко