



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Виканол® Лайф

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Регистрационный номер: № ЛП-004459

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » **04 06 20** 201 г.

Старая редакция	Новая редакция
Применение во время беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата Виканол® Лайф при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.	Применение во время беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата Виканол® Лайф при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. <i>При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.</i>
Способ применения и дозы Препарат принимают внутрь. <u>Взрослым и детям старше 12-ти лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, обед и ужин) и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 8 до 12 лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 4 до 8 лет</u> назначают в дозе 8 мг/кг/сутки; в зависимости от массы тела ребенка назначают по 1-2 таблетки в сутки (соответственно, в 1-2 приема в сутки). При этом суточная доза должна быть наиболее близка к расчетной дозе (8 мг/кг/сутки).	Способ применения и дозы Препарат принимают внутрь. <u>Взрослым и детям старше 12-ти лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, обед и ужин) и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 8 до 12 лет</u> препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи (завтрак, ужин). <u>Детям от 4 до 8 лет</u> назначают в дозе 8 мг/кг/сутки; в зависимости от массы тела ребенка назначают по 1-2 таблетки в сутки (соответственно, в 1-2 приема в сутки). При этом суточная доза должна быть наиболее близка к расчетной дозе (8 мг/кг/сутки).

Старая редакция	Новая редакция
Препарат принимают за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством воды. Не рекомендуется запивать таблетки молоком. Продолжительность курса лечения 4-8 недель. В течение следующих 8 недель не следует применять препараты, содержащие висмут (например, Викаир, Викалин). Для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> целесообразно применение препарата в комбинации с другими антибактериальными средствами, обладающими антихеликобактерной активностью (по рекомендации врача).	Препарат принимают за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством воды. Не рекомендуется запивать таблетки молоком. Продолжительность курса лечения 4-8 недель. В течение следующих 8 недель не следует применять препараты, содержащие висмут (например, Викаир, Викалин). Для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> целесообразно применение препарата в комбинации с другими антибактериальными средствами, обладающими антихеликобактерной активностью (по рекомендации врача). <i>Если в течение лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.</i>
Побочное действие Частота побочных эффектов препарата оценивается следующим образом: Очень частые: $\geq 1/10$, частые: $\geq 1/100$, $< 1/10$, нечастые: $\geq 1/1000$, $< 1/100$, редкие: $\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$, очень редкие: $< 1/10\ 000$. <i>Со стороны желудочно-кишечного тракта:</i> очень часто – окрашивание кала в черный цвет; нечасто – тошнота, рвота, диарея или запоры. <i>Аллергические реакции:</i> нечасто – кожная сыпь, зуд; очень редко – анафилактические реакции. <i>Со стороны нервной системы:</i> очень редко – при длительном применении в высоких дозах возможно развитие энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе (ЦНС).	Побочное действие Частота побочных эффектов препарата оценивается следующим образом: Очень частые: $\geq 1/10$, частые: $\geq 1/100$, $< 1/10$, нечастые: $\geq 1/1000$, $< 1/100$, редкие: $\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$, очень редкие: $< 1/10\ 000$. <i>Со стороны желудочно-кишечного тракта:</i> очень часто – окрашивание кала в черный цвет; нечасто – тошнота, рвота, диарея или запоры. <i>Аллергические реакции:</i> нечасто – кожная сыпь, зуд; очень редко – анафилактические реакции. <i>Со стороны нервной системы:</i> очень редко – при длительном применении в высоких дозах возможно развитие энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе (ЦНС).

Старая редакция	Новая редакция
Побочные эффекты являются обратимыми и быстро проходят после отмены препарата.	Побочные эффекты являются обратимыми и быстро проходят после отмены препарата. <i>Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.</i>
Условия хранения При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.

Генеральный директор
ООО НПО «ФармВИЛАР»



К.Ю. Калиниченко