МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Диоридинвел®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 450 мг

лекарственная форма, дозировка

Общество с ограниченной ответственностью «Велфарм» (ООО «Велфарм»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 120821 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку: *Действующие вещества:* гесперидин – 50 мг, диосмин – 450 мг. *Вспомогательные вещества:* желатин, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят, примогель), тальк, вода очищенная, опадрай II 32F230011 оранжевый (гипромеллоза, лактозы моногидрат, титана диоксид, макрогол-4000, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный).	**Состав на одну таблетку:** *Действующие вещества:* гесперидин – 50,0 мг, диосмин – 450,0 мг. *Вспомогательные вещества:* желатин, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая (101), карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят, примогель), тальк. *Состав оболочки:* Сухая смесь для пленочного покрытия (Опадрай® 03G230004 оранжевый), содержащая гипромеллозу, титана диоксид, макрогол, магния стеарат, глицерин (глицерол), краситель оксид железа желтый, краситель оксид железа красный, натрия лаурилсульфат.
Противопоказания Гиперчувствительность, период грудного вскармливания. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром	**Противопоказания** Гиперчувствительность, период грудного вскармливания.

Изменение № 4 к инструкции по применению С.2

Старая редакция	Новая редакция
глюкозо-галактозной мальабсорбции.	
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 450 мг. 10, 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 таблеток в банку полимерную из полипропилена или полиэтилена низкого давления. Каждую банку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 1, 2, 3, 4, 5, 6 контурных ячейковых упаковок по 12 таблеток с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 450 мг. 10, 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 таблеток в банку полимерную из полипропилена с крышкой натягиваемой из полиэтилена высокого давления или в банку полимерную из полиэтилена низкого давления с крышкой натягиваемой из полиэтилена низкого давления или с крышкой навинчиваемой из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия или без контроля, с уплотняющим элементом или без него. Дополнительно допускается использовать вату медицинскую гигроскопическую или амортизатор. Каждую банку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 1, 2, 3, 4, 5, 6 контурных ячейковых упаковок по 12 таблеток с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель фирмы С.А. Гасанова