

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бефунгин®

раствор для приема внутрь

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Дата внесения Изменения "___" _____ 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 100 мл <i>Действующие вещества:</i> гриб березовый (чага) - 100 г, кобальта хлорида гексагидрат (кобальт хлористый 6-водный) - 0,176 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> этанол (спирт этиловый) 95 %, вода очищенная. Способ применения и дозы Препарат применяют внутрь в виде разведенного раствора за 30 минут до еды. Для приготовления раствора препарата содержимое флакона взбалтывают, разводят 1 чайную ложку (5 мл) препарата в 50 мл теплой кипяченой воды. Принимают по 1 столовой ложке (15 мл) полученного раствора 3 раза в день в течение 3-5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами 7 - 10 дней.	Состав на 100 мл <i>Действующие вещества:</i> гриб березовый (чага) - 100 г, кобальта хлорида гексагидрат - 0,176 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> этанол (спирт этиловый) 95 %, вода очищенная. Способ применения и дозы Препарат применяют внутрь в виде разведенного раствора за 30 минут до еды. Для приготовления раствора препарата содержимое флакона взбалтывают, разводят 1 чайную ложку (5 мл) препарата в 50 мл теплой кипяченой воды. Принимают по 1 столовой ложке (15 мл) полученного раствора 3 раза в день в течение 3-5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами 7 - 10 дней.

Старая редакция	Новая редакция
	Для точного дозирования препарата в упаковку может вкладываться ложка мерная или стаканчик мерный.

Начальник отдела регистрации
ЛС, БАД и ИМН



Н.В. Матрина
"04" 08 2024 г.