

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

КРУШИНЫ СИРОП

наименование лекарственного препарата

(Frangulae sirupus)

Регистрационный номер:

Торговое название: Крушины сироп

Лекарственная форма: сироп

Состав

Для приготовления 1000 г препарата необходимо:

Крушины коры измельченной	— 415 г
Воды очищенной	— до получения 500 мл экстракта
Сахара (сахароза)	— 500 г

Описание

Жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительное средство растительного происхождения.

Код АТХ

[A06A].

Фармакологическое действие

Оказывает слабительное действие, наступающее через 8-12 ч после приема. Слабительный эффект обусловлен наличием антраценпроизводных гликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника.

Показания к применению

Хронический запор.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания кишечника (энтерит, колит), метроррагия, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, детский возраст до 3 лет.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью

Больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. В период грудного вскармливания и больным с паренхиматозными поражениями почек и печени.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, натощак. Взрослым и детям старше 12 лет – по 5-10 мл (1-2 чайные ложки) сиропа 1-2 раза в день, максимальная разовая доза – 15 мл (3 чайные ложки); детям, в зависимости от возраста, 1 раз в день перед сном: 3-4 года – по 1,25 мл (1/4 чайной ложки); 5-8 лет – по 2,5-5 мл (1/2-1 чайной ложке);

9-11 лет – по 5-7,5 мл (1-1,5 чайной ложки). Курс лечения без консультации врача не более 2-х недель.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), абдоминальные боли, диспептические явления, окрашивание мочи в желтый цвет (из-за наличия хризофановой кислоты), что не требует отмены препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Особые указания

При длительном применении препарата развивается привыкание, в связи с чем его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами. Перед назначением препарата необходимо установить генез нарушений функции кишечника.

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что одна чайная ложка сиропа (5 мл) содержит 3,2 г сахара (0,27 ХЕ).

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Сироп. По 100 мл во флаконах оранжевого стекла или флаконах из полиэтилентерефталата прозрачных, коричневого цвета. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии

ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ»



С.А. Постельников
ФИО