МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000985-230315
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Назик®

наименование лекарственного препарата

спрей назальный дозированный 0,1 мг + 5 мг/доза

лекарственная форма, дозировка

Клостерфрау Берлин ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 230315 20___ г.

Регистрационный номер: **ЛП-000985-181011**

Старая редакция	**Новая редакция**
Международное непатентованное название Ксилометазолин + Декспантенол	**Международное непатентованное или группировочное наименование** Ксилометазолин + Декспантенол
Способ применения и дозы Интраназально. Для взрослых и детей старше 6 лет. Извлечь помповое дозирующее устройство из упаковки. Откупорить флакон с препаратом, накрутить на горлышко флакона дозирующее устройство, снять защитный колпачок.	**Способ применения и дозы** Интраназально. Для взрослых и детей старше 6 лет. *При использовании флакона с помповым дозирующим устройством, упакованным отдельно.* Извлечь помповое дозирующее устройство из упаковки. Откупорить

Перед первым применением спрея несколько раз нажать на помповое дозирующее устройство до появления равномерного распыления. При применении назального спрея флакон необходимо держать в вертикальном положении. Во время впрыскивания нужно легко вдохнуть носом. Одно впрыскивание в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Продолжительность терапии 3-5 дней.	флакон с препаратом, накрутить на горлышко флакона дозирующее устройство, снять защитный колпачок. Флакон готов к использованию. Перед первым применением спрея несколько раз нажать на помповое дозирующее устройство до появления равномерного распыления. *При использовании флакона со встроенным помповым дозирующим устройством.* Снять защитный колпачок со встроенного помпового дозирующего устройства. Флакон готов к использованию. Перед первым применением спрея несколько раз нажать на встроенное помповое дозирующее устройство до появления равномерного распыления. При применении спрея флакон необходимо держать в вертикальном положении. Во время впрыскивания нужно легко вдохнуть носом. Одно впрыскивание в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Продолжительность терапии 3-5 дней.

Форма выпуска Спрей назальный дозированный 0,1 мг + 5 мг/доза. Не менее 100 доз. По 10 мл во флаконе из янтарного стекла, укупоренном пропиленовой навинчивающейся крышкой. Помповое дозирующее устройство с защитным колпачком из полиэтилена упаковано в индивидуальную упаковку. 1 флакон и 1 помповое дозирующее устройство вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Спрей назальный дозированный 0,1 мг + 5 мг/доза. *Флакон с помповым дозирующим устройством, упакованным отдельно.* По 10 мл (не менее 100 доз) во флаконе из янтарного стекла, укупоренном полипропиленовой навинчивающейся крышкой. Помповое дозирующее устройство с защитным колпачком из полипропилена упаковано в индивидуальную упаковку. 1 флакон и 1 помповое дозирующее устройство вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. *Флакон со встроенным помповым дозирующим устройством.* По 10 мл (не менее 100 доз) во флаконе из янтарного стекла со встроенным помповым дозирующим устройством и защитным колпачком из полипропилена. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Генеральный директор
ООО «ЭмСиЭл-фарма» Лосева Э. В.