



ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Лидокаин

наименование лекарственного препарата

спрей для местного применения дозированный 4,6 мг/доза

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», Венгрия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » **04 07 16** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: бесцветный спиртовой раствор с характерным ментоловым запахом.	Описание: почти бесцветный спиртовой раствор с характерным ментоловым запахом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Применяют местно, наружно. Дозировка может варьировать в зависимости от показаний и размера зоны, подлежащей анестезии. Одна доза спрея, освобождаемая нажатием на дозирующий клапан, содержит 4,8 мг лидокаина. Во избежание достижения высоких концентраций препарата в плазме крови следует применять самые низкие дозы, при которых наблюдается удовлетворительный эффект. Обычно достаточно 1 - 2 нажатий на клапан, однако в акушерской практике наносят 15 -20 или более доз (максимальное количество - 40 доз на 70 кг массы тела).	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Применяют местно, наружно. Дозировка может варьировать в зависимости от показаний и размера зоны, подлежащей анестезии. Одна доза спрея, освобождаемая нажатием на дозирующий клапан, содержит 4,6 мг лидокаина. Во избежание достижения высоких концентраций препарата в плазме крови следует применять самые низкие дозы, при которых наблюдается удовлетворительный эффект. Обычно достаточно 1 - 2 нажатий на клапан, однако в акушерской практике наносят 15 -20 или более доз (максимальное количество - 40 доз на 70 кг массы тела).

Старая редакция	Новая редакция																																
<u>Рекомендованные дозы при различных показаниях</u> <table> <tr> <th>Применение</th><th>Доза (число нажатий на клапан)</th></tr> <tr> <td>Стоматология</td><td>1-3</td></tr> <tr> <td>Стоматологическая хирургия</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>Оториноларингология</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>Эндоскопия</td><td>2-3</td></tr> <tr> <td>Акушерство</td><td>15-20</td></tr> <tr> <td>Гинекология</td><td>4-5</td></tr> <tr> <td>Дерматология</td><td>1-3</td></tr> </table> Препарат можно также наносить при помощи смоченного в нем ватного тампона. <u>Дети</u> При проведении стоматологических процедур и операций применять у детей Лидокаин спрей предпочтительно использовать при помощи ватного тампона, что позволяет избежать испуга при распылении препарата, а также ощущения покалывания (обычного побочного эффекта).	Применение	Доза (число нажатий на клапан)	Стоматология	1-3	Стоматологическая хирургия	1-4	Оториноларингология	1-4	Эндоскопия	2-3	Акушерство	15-20	Гинекология	4-5	Дерматология	1-3	<u>Рекомендованные дозы при различных показаниях</u> <table> <tr> <th>Применение</th><th>Доза (число нажатий на клапан)</th></tr> <tr> <td>Стоматология</td><td>1-3</td></tr> <tr> <td>Стоматологическая хирургия</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>Оториноларингология</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>Эндоскопия</td><td>2-3</td></tr> <tr> <td>Акушерство</td><td>15-20</td></tr> <tr> <td>Гинекология</td><td>4-5</td></tr> <tr> <td>Дерматология</td><td>1-3</td></tr> </table> Препарат можно также наносить при помощи смоченного в нем ватного тампона. <u>Дети</u> При проведении стоматологических процедур и операций применять у детей Лидокаин спрей предпочтительно использовать при помощи ватного тампона, что позволяет избежать испуга при распылении препарата, а также ощущения покалывания (обычного побочного эффекта).	Применение	Доза (число нажатий на клапан)	Стоматология	1-3	Стоматологическая хирургия	1-4	Оториноларингология	1-4	Эндоскопия	2-3	Акушерство	15-20	Гинекология	4-5	Дерматология	1-3
Применение	Доза (число нажатий на клапан)																																
Стоматология	1-3																																
Стоматологическая хирургия	1-4																																
Оториноларингология	1-4																																
Эндоскопия	2-3																																
Акушерство	15-20																																
Гинекология	4-5																																
Дерматология	1-3																																
Применение	Доза (число нажатий на клапан)																																
Стоматология	1-3																																
Стоматологическая хирургия	1-4																																
Оториноларингология	1-4																																
Эндоскопия	2-3																																
Акушерство	15-20																																
Гинекология	4-5																																
Дерматология	1-3																																
ФОРМА ВЫПУСКА Спрей для местного применения дозированный 10%. По 38 г (650 доз) во флаконе из коричневого стекла, вместимостью 50 мл, снабженного дозирующим насосом с распылительной головкой. Флакон вкладывается вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	ФОРМА ВЫПУСКА Спрей для местного применения дозированный 4,6 мг/доза. По 38 г (650 доз) во флаконе из коричневого стекла, вместимостью 50 мл, снабженного дозирующим насосом с распылительной головкой. Флакон вкладывается вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.																																

Директор по регистрации лекарственных средств
Представительства ЗАО «Фармацевтический
завод ЭГИС» (Венгрия) г. Москва

