МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
17N012638/02 - 280520
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Макмирор Комплекс
торговое наименование лекарственного препарата

крем вагинальный
лекарственная форма, дозировка

Доппель Фармацеутици С.р.л., Италия
наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 280520 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Макмирор Комплекс	**Торговое наименование препарата:** Макмирор® Комплекс
Международное непатентованное название: -	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** нистатин + нифурател
Фармакологические свойства **Фармакодинамика:** противомикробный препарат для местного применения. Оказывает противопротозойное,	**Фармакологические свойства** **Фармакодинамика:** противомикробный препарат для местного применения. Оказывает противопротозойное,

противогрибковое и антибактериальное действие. Нифурател, производное нитрофурана. Высокоактивен в отношении ряда бактерий, грибов и простейших (в т.ч. Trichomonas vaginalis). Нистатин – противогрибковый антибиотик группы полиенов. Связываясь со стеролами в клеточной мембране грибов, нарушает ее проницаемость, что приводит к гибели клетки. Высокоактивен в отношении Candida albicans. Комбинация нифуратела и нистатина позволяет достичь более выраженного противогрибкового действия и значительно расширить спектр противомикробного действия. Высокая эффективность и низкая токсичность компонентов препарата обусловливают широкий спектр его клинического применения в лечении вагинитов смешанной этиологии, в частности, использование для	противогрибковое и антибактериальное действие. Нифурател – производное нитрофурана. Высокоактивен в отношении ряда бактерий, грибов и простейших (в т.ч. Trichomonas vaginalis). Нистатин – противогрибковый антибиотик группы полиенов. Связываясь со стеролами в клеточной мембране грибов, нарушает ее проницаемость, что приводит к гибели клетки. Высокоактивен в отношении Candida albicans. Комбинация нифуратела и нистатина позволяет достичь более выраженного противогрибкового действия и значительно расширить спектр противомикробного действия. Высокая эффективность и низкая токсичность компонентов препарата обусловливают широкий спектр его клинического применения в лечении вагинитов смешанной этиологии, в частности, использование для

профилактики микозов, вызванных специфическим лечением трихомониаза. Макмирор Комплекс не нарушает физиологическую флору, что позволяет избежать развития дисбактериоза и быстро восстановить нормоценоз влагалища. **Фармакокинетика:** проведенные исследования подтверждают, что при вагинальном применении у животных (кролики и собаки) с повторным введением суточной дозы, что в 30 раз превышало терапевтическую дозу, вещества, входящие в состав препарата не абсорбируются в кровоток и не оказывают системного действия. Исследования фармакокинетики у человека не проводились.	профилактики микозов, вызванных специфическим лечением трихомониаза. Макмирор® Комплекс не нарушает физиологическую флору, что позволяет избежать развития дисбактериоза и быстро восстановить нормоценоз влагалища. **Фармакокинетика:** проведенные исследования подтверждают, что при вагинальном применении у животных (кролики и собаки) с повторным введением суточной дозы, что в 30 раз превышало терапевтическую дозу, вещества, входящие в состав препарата не абсорбируются в кровоток и не оказывают системного действия. Исследования фармакокинетики у человека не проводились.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Макмирор Комплекс с	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Макмирор® Комплекс с

другими лекарственными средствами.	другими лекарственными средствами.

Старший специалист по регистрации лекарственных препаратов Тычинская Д.А.