

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Назол®ОксиметазолинСпрей назальный дозированный 0,025 мг/дозаИнститут де Ангели С.р.Л., Италия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « ____ » **160322** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Для облегчения носового дыхания при «простудных» заболеваниях и вирусных инфекциях верхних дыхательных путей, синусите, рините любой этиологии. Противопоказания Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам, атрофический (сухой) ринит, закрытоугольная глаукома, состояния после трансфеноидальной гипофизэктомии, хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе), воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа, детский возраст до 6 лет.	Показания к применению Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, обострение вазомоторного ринита, для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите, среднем отите, для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах. Противопоказания • Гиперчувствительность к оксиметазолину и другим компонентам препарата; • закрытоугольная глаукома; • хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе); • состояние после трансфеноидальной гипофизэктомии; • атрофический (сухой) ринит;

139677


Изменение № 5 к Инструкции _____ С. 2

Старая редакция	Новая редакция
	• воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа; • детский возраст до 6 лет.

Специалист по регистрации



Грюнвальд М.А.



139677