

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Назол®

Оксиметазолин

Спрей назальный дозированный 0,025 мг/доза

Институт де Ангели С.р.Л., Италия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «22» 08 2022 г.

Старая редакция			Новая редакция		
Состав			Состав		
	100 мл	1 доза		100 мл	1 доза
	содержат:	содержит:		содержат:	содержит:
действующее вещество:			действующее вещество:		
оксиметазолина гидрохлорид	0,05 г	0,025 мг	оксиметазолина гидрохлорид	0,05 г	0,025 мг
вспомогательные вещества:			вспомогательные вещества:		
бензалкония хлорид	0,02 г	0,01 мг	бензалкония хлорид*	0,02 г	0,01 мг
макрогол 400	7,5 г	3,75 мг	макрогол 400	7,5 г	3,75 мг
повидон	0,4 г	0,2 мг	повидон	0,4 г	0,2 мг
пропиленгликоль	7,5 г	3,75 мг	пропиленгликоль	7,5 г	3,75 мг
натрия гидрофосфат дигидрат	0,006 г	0,003 мг	натрия гидрофосфат дигидрат	0,006 г	0,003 мг
натрия дигидрофосфат дигидрат	0,65 г	0,325 мг	натрия дигидрофосфат дигидрат	0,65 г	0,325 мг
динатрия эдетат дигидрат	0,1 г	0,05 мг	динатрия эдетат дигидрат	0,1 г	0,05 мг
кислота хлористо-			кислота хлористо-		

Старая редакция			Новая редакция		
водородная конц.	0,003 г	0,0015 мг	водородная конц.**	0,003 г	0,0015 мг
вода очищенная	86,571 г	43,2855 мг	вода очищенная	86,571 г	43,2855 мг


*Указанное количество относится к сухому веществу. При использовании бензалкония хлорида, содержащего воду, следует определить количество воды и соответственно увеличить количество используемого консерванта. Вес воды очищенной следует откорректировать соответствующим образом

**Указанное количество относится к хлористоводородной кислоте концентрированной. При использовании хлористоводородной кислоты другой концентрации следует применять соответственно большее количество вещества. Массу воды очищенной следует откорректировать соответствующим образом

Руководитель группы пострегистрационного мониторинга



И.А. Шпакова



140407