МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Панкреатин-ЛекТ
наименование лекарственного препарата
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
лекарственная форма, дозировка
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___»_211112_ 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ (информация для потребителей) по медицинскому применению препарата **ПАНКРЕАТИН - ЛекТ** **Регистрационный номер:**	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **ПАНКРЕАТИН - ЛекТ**
Состав: 1 таблетка содержит: Активное вещество: панкреатин с активностями, не менее: Протеолитическая активность – 200 ЕД ФИП	**Состав:** 1 таблетка содержит: Активное вещество: панкреатин – 90 мг с активностями, не менее: Протеолитическая активность – 200 ЕД ФИП

15785

Амилолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Липолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Вспомогательные вещества: сахар молочный (лактоза), поливинилпирролидон низкомолекулярный, микрокристаллическая целлюлоза МКЦ, кальция стеарат, сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом, кислотный красный, титана диоксид (титана двуокись пигментная марка А), полисорбат (твин-80), макрогол (полиэтилен-гликоль 6000), тальк. **Форма выпуска** Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой. По 10 таблеток в	Амилолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Липолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) – 106 мг, лактопресс – 16 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный) – 4,8 мг, микрокристаллическая целлюлоза МКЦ – 100 мг, кальция стеарат – 3,2 мг, сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом – 12,3 мг, кислотный красный – 0,12 мг, титана диоксид (титана двуокись пигментная марка А) – 0,37 мг, полисорбат (твин-80) – 0,4 мг, макрогол (полиэтиленгликоль 6000) – 1,5 мг, тальк – 0,31 мг. **Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Негативного влияния на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами препарат не оказывает. **Форма выпуска** Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой. По 10, 15, 20

контурную ячейковую упаковку. По 60 таблеток в банки оранжевого стекла типа БДС или банки оранжевого стекла типа БВ, или в банки полимерные типа БП. По 2, 3, 6 контурных ячейковых упаковок или каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.	таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 60 таблеток в банки оранжевого стекла типа БДС или банки оранжевого стекла типа БВ, или в банки полимерные типа БП. По 6, 4, 3 контурных ячейковых упаковок или каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.
Условия хранения В сухом месте при температуре не выше 20 °С. В недоступном для детей месте.	**Условия хранения** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности** 2 года. Не использовать по истечении срока годности.
Изготовитель: ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» Россия, 625005, г. Тюмень, ул. Береговая, 24. Тел/факс: (3452) 46-23-50	**Производитель/ Претензии от покупателей принимает предприятие - производитель:** ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» Россия, 625005, г. Тюмень, ул. Береговая, 24. Тел/факс: (3452) 25-48-63

Генеральный директор

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» / Н.Е. Морев

15785