МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006070/08- 160813
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Панкреатин-ЛекТ
наименование лекарственного препарата
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
лекарственная форма, дозировка
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 160813 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
	Регистрационный номер: ЛСР- 006070/08 от 31.07.2008
Лекарственная форма: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.	**Лекарственная форма:** Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой. В одной таблетке содержится 90 мг панкреатина, что эквивалентно (в единицах Международной Федерации – F.I.P.) не менее: протеаза – 180, амилаза – 2800, липаза – 2800.
Состав: 1 таблетка содержит: Активное вещество: панкреатин – 90 мг с активностями, не менее: Протеолитическая активность – 200 ЕД ФИП	**Состав:** Активное вещество: панкреатин – 90 мг с активностями, не менее: Протеолитическая активность – 200 ЕД ФИП Амилолитическая активность –

Амилолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Липолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) – 106 мг, лактопресс – 16 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный) – 4,8 мг, микрокристаллическая целлюлоза МКЦ – 100 мг, кальция стеарат – 3,2 мг, сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом – 12,3 мг, кислотный красный – 0,12 мг, титана диоксид (титана двуокись пигментная марка А) – 0,37 мг, полисорбат (твин-80) – 0,4 мг, макрогол (полиэтиленгликоль 6000) – 1,5 мг, тальк – 0,31 мг.	3500 ЕД ФИП Липолитическая активность – 3500 ЕД ФИП Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) – 106 мг, лактоза (лактопресс) – 16 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный) – 4,8 мг, микрокристаллическая целлюлоза МКЦ – 100 мг, кальция стеарат – 3,2 мг, сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом – 12,3 мг, краситель азорубин (кислотный красный 2С) – 0,12 мг, титана диоксид (титана двуокись пигментная марка А) – 0,37 мг, полисорбат (твин-80) – 0,4 мг, макрогол (полиэтиленгликоль 6000) – 1,5 мг, тальк – 0,31 мг.

Генеральный директор ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» Н.Е. Морев