

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

РЕКВИП МОДУТАБ® / REQUIP MODUTAB®

Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой,
 2 мг, 4 мг, 8 мг

«СмитКляйнБичем ПиЭлСи», Великобритания
 «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.», Польша
 «Глаксо Вэлком С.А.», Испания

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «__» 28 04 14 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания для применения - Болезнь Паркинсона: - Монотерапия ранних стадий заболевания у пациентов, нуждающихся в дофаминергической терапии. - В качестве комбинированной терапии у пациентов, получающих препараты леводопы, в целях повышения эффективности леводопы, включая контроль колебания («включение-выключение») и эффекта «конца дозы» на фоне хронической терапии леводопы, а также в целях снижения суточной дозы леводопы.	Показания к применению Болезнь Паркинсона: - монотерапия ранних стадий заболевания у пациентов, нуждающихся в дофаминергической терапии, чтобы отсрочить назначение препаратов леводопы; - в качестве комбинированной терапии у пациентов, получающих препараты леводопы, в целях повышения эффективности леводопы, включая контроль флуктуаций терапевтического действия леводопы (феномен «включения-выключения») и эффекта «конца дозы» на фоне хронической терапии леводопы, а также в целях снижения суточной дозы леводопы.

Менеджер отдела
 регуляторных отношений
 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»



Старкова Н.С.