

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

РЕКВИП МОДУТАБ® / REQUIP MODUTAB®

Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой,
 2 мг, 4 мг, 8 мг

«СмитКляйн Бичем ПиЭлСи», Великобритания

«ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.», Польша

«Глаксо Вэлком С.А.», Испания

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «__» 12 09 14 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
УПАКОВКА По 21 таблетке дозировкой 2 мг в блистере из ПВХ/ПХТФЭ/Al или ПВХ/ПХТФЭ/ПВХ/Al. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачке картонной. По 14 таблеток (всех дозировок) в блистере из ПВХ/ПХТФЭ/Al или ПВХ/ПХТФЭ/ПВХ/Al. По 2 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.	ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг, 8 мг. По 21 таблетке дозировкой 2 мг в блистере из ПВХ/ПХТФЭ/Al или ПВХ/ПХТФЭ/ПВХ/Al. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачке картонной. По 14 таблеток (всех дозировок) в блистере из ПВХ/ПХТФЭ/Al или ПВХ/ПХТФЭ/ПВХ/Al. По 2 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Менеджер отдела
 регуляторных отношений
 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»



Старкова Н.С.