

ИНСТРУКЦИЯ
 ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

РЕКВИП МОДУТАБ® / REQUIP MODUTAB®

**Таблетки пролонгированного действия,
 покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг, 8 мг
 «Глаксо Вэллком С.А.», Испания**


Изменение № 7

Дата внесения Изменения «280818» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг, 8 мг. По 14 таблеток в блистер из ПВХ/ПХТФЭ/ПВХ/Al. По 2 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. *- ПХТФЭ – полихлортрифторэтилен.	ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг, 8 мг. По 14 таблеток в блистер из ПВХ/ПХТФЭ*/ПВХ/Al или в блистер из ПВХ/ПЭ/ПВдХ**/Al/бумага с защитой от вскрытия детьми. По 2 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. *ПХТФЭ – полихлортрифторэтилен, **ПВдХ – поливинилиденхлорид.

Менеджер отдела
 регуляторных отношений
 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Балакина Е.М.



С. 1 из 1

110423