



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

РЕКВИП МОДУТАВ® / REQUIP MODUTAB®

Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой,
2 мг, 4 мг, 8 мг

«Глаксо Вэллком С.А.», Испания

Изменение № 11

Дата внесения Изменения «__» 03 10 19 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг, 8 мг. По 14 таблеток в блистер из ПВХ/ПХТФЭ*/ПВХ/АI или в блистер из ПВХ/ПЭ/ПВДХ**/АI/бумага с защитой от вскрытия детьми. По 2 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. *ПХТФЭ – полихлортрифторэтилен, **ПВДХ – поливинилиденхлорид.	ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг, 8 мг. По 14 таблеток в блистер из ПВХ/ПХТФЭ*/ПВХ/АI или в блистер из ПВХ/ПЭ/ПВДХ**/АI/бумаги с защитой от вскрытия детьми. По 2 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия. *ПХТФЭ – полихлортрифторэтилен, **ПВДХ – поливинилиденхлорид.

Менеджер отдела
регуляторных отношений
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»



Старкова Н.С.