

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Тиоктацид® БВ

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг

МЕДА Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия,
произведено МЕДА Мануфактуринг ГмбХ, Германия.

Изменение № 2

Срок введения изменений с 05 июля 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>Активное вещество:</i> тиоктовая кислота (α-липоевая кислота) – 600 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> гипролоза низкозамещенная, гипролоза, магния стеарат. <i>Пленочная оболочка:</i> гипромеллоза, макрогол 6000, титана диоксид, тальк, алюминиевый лак на основе красителя хинолиновый желтый, алюминиевый лак на основе	Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>Активное вещество:</i> тиоктовая кислота (α-липоевая кислота) – 600 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> гипролоза низкозамещенная 157,00 мг, гипролоза 20,00 мг, магния стеарат 24,00 мг. <i>Пленочная оболочка:</i> гипромеллоза 15,80 мг, макрогол 6000 4,70 мг, титана диоксид 4,00 мг, тальк 2,02 мг, алюминиевый лак на основе

индигокармина.

Фармакокинетика

При приеме внутрь быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Прием препарата одновременно с приемом пищи может снизить всасывание препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30 минут после приема Тиоктацида БВ и составляет 4 мкг/мл. Препарат обладает эффектом «первого прохождения» через печень, абсолютная биодоступность тиоктовой кислоты составляет 20%. Период полувыведения - 25 минут. Основные пути метаболизма - окисление и конъюгация. Тиоктовая кислота и ее метаболиты выводятся почками (80-90%).

Претензии потребителей направлять по адресу представительства в РФ:

красителя хинолиновый желтый 1,32 мг, алюминиевый лак на основе индигокармина 0,16 мг.


Фармакокинетика

При приеме препарата Тиоктацид БВ (быстрое высвобождение), тиоктовая кислота быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Прием препарата одновременно с приемом пищи может снизить всасывание препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30 минут после приема Тиоктацида БВ и составляет 4 мкг/мл. Препарат обладает эффектом «первого прохождения» через печень, абсолютная биодоступность тиоктовой кислоты составляет 20%. Период полувыведения - 25 минут. Основные пути метаболизма - окисление и конъюгация. Тиоктовая кислота и ее метаболиты выводятся почками (80-90%).

Претензии потребителей направлять по адресу представительства в РФ:

125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5/2, офис 216 Тел. (495) 748-5193 Факс (495) 748-5194	109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29 Тел. (495) 748-5193, 660-53-03 Факс (495) 660-53-06
---	--

Представитель фирмы



И.В. Семина

Семина И.В.