

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Тиоктацид® БВ

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг

МЕДА Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия,
произведено МЕДА Мануфакчуриг ГмбХ, Германия.

Изменение № 3

Срок введения изменений с 06 12 12 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакокинетика При приеме препарата Тиоктацид БВ (быстрое высвобождение), тиоктовая кислота быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Прием препарата одновременно с приемом пищи может снизить всасывание препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30 минут после приема Тиоктацида БВ и составляет 4 мкг/мл. Препарат обладает эффектом «первого прохождения»	Фармакокинетика Тиоктацид БВ (быстрое высвобождение) представляет собой оптимизированную лекарственную форму для перорального применения, которая позволяет избежать высокой вариабельности уровня тиоктовой кислоты в плазме крови. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30 минут после приема Тиоктацида БВ и составляет 4 мкг/мл. При приеме внутрь быстро и полностью всасывается из

через печень, абсолютная биодоступность тиоктовой кислоты составляет 20%. Период полувыведения - 25 минут. Основные пути метаболизма - окисление и конъюгация. Тиоктовая кислота и ее метаболиты выводятся почками (80-90%).	желудочно-кишечного тракта. Применение Тиоктацида БВ (быстрое высвобождение) позволяет избежать нежелательного взаимодействия с пищей, т.к. при условии приема за 30 мин до еды (согласно рекомендациям) всасывание препарата на момент приема пищи уже завершено. Препарат обладает эффектом «первого прохождения» через печень, абсолютная биодоступность тиоктовой кислоты составляет 20%. Период полувыведения - 25 минут. Основные пути метаболизма - окисление и конъюгация. Тиоктовая кислота и ее метаболиты выводятся почками (80-90%).
---	---

Представитель фирмы



И.В. Семина

Семина И.В.