

ИНСТРУКЦИЯ
 ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Транексам®
 раствор для внутривенного введения 50 мг/мл
 ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 020318 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутривенно капельно или струйно медленно; скорость введения 1 мл/мин (50 мг/мин). Следует избегать быстрого внутривенного введения! <u>Взрослые пациенты:</u> • <i>Меноррагии и метроррагии, желудочно-кишечные кровотечения:</i> 500 мг (1 ампула 5,0 мл) 2-3 раза в сутки с момента развития кровотечения до его остановки. • <i>Лечение кровотечений после хирургических вмешательств на предстательной железе и мочевыводящих путях:</i> 1000 мг (2 ампулы 5,0 мл) 3 раза в сутки с момента развития кровотечения до его остановки. • <i>Профилактика и лечение кровотечений при оперативных вмешательствах в полости носа, рта и глотки:</i> 10-15 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов до остановки	Способ применения и дозы Внутривенно капельно или струйно медленно; скорость введения 1 мл/мин (50 мг/мин). Следует избегать быстрого внутривенного введения! <u>Взрослые пациенты:</u> • <i>Меноррагии и метроррагии, желудочно-кишечные кровотечения:</i> 500 мг (2 ампулы по 5 мл) 2-3 раза в сутки с момента развития кровотечения до его остановки. • <i>Лечение кровотечений после хирургических вмешательств на предстательной железе и мочевыводящих путях:</i> 1000 мг (4 ампулы по 5 мл) 3 раза в сутки с момента развития кровотечения до его остановки. • <i>Профилактика и лечение кровотечений при оперативных вмешательствах в полости носа, рта и глотки:</i> 10-15 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов до остановки

кровотечения.

- **Профилактика и лечение кровотечений при торакальных, абдоминальных и иных больших оперативных вмешательствах:** 15 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов до остановки кровотечения.
- **Профилактика и лечение кровотечений при кардиохирургических операциях:** нагрузочная доза 15 мг/кг после индукции анестезии до начала оперативного вмешательства, затем внутривенная инфузия со скоростью 4,5 мг/кг/час в течение всей операции; рекомендуется ввести транексамовую кислоту в дозе 0,6 мг/кг в аппарат искусственного кровообращения.
- **Лечение акушерско-гинекологических кровотечений (включая кровотечения при гинекологических оперативных вмешательствах):** 15 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов с момента развития кровотечения до его остановки.
- **Лечение кровотечений, вызванных применением фибринолитических лекарственных средств:** 10 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов с момента развития кровотечения до его остановки.

В случае необходимости длительной (более 48 часов) гемостатической терапии рекомендуется применение препаратов транексамовой кислоты в таблетированной лекарственной форме.

кровотечения.

- **Профилактика и лечение кровотечений при торакальных, абдоминальных и иных больших оперативных вмешательствах:** 15 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов до остановки кровотечения.
- **Профилактика и лечение кровотечений при кардиохирургических операциях:** нагрузочная доза 15 мг/кг после индукции анестезии до начала оперативного вмешательства, затем внутривенная инфузия со скоростью 4,5 мг/кг/час в течение всей операции; рекомендуется ввести транексамовую кислоту в дозе 0,6 мг/кг в аппарат искусственного кровообращения.
- **Лечение акушерско-гинекологических кровотечений (включая кровотечения при гинекологических оперативных вмешательствах):** 15 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов с момента развития кровотечения до его остановки.
- **Лечение кровотечений, вызванных применением фибринолитических лекарственных средств:** 10 мг/кг массы тела каждые 6-8 часов с момента развития кровотечения до его остановки.

В случае необходимости длительной (более 48 часов) гемостатической терапии рекомендуется применение препаратов транексамовой кислоты в таблетированной лекарственной форме.

Дети старше 1 года

Опыт применения препаратов транексамовой кислоты у детей ограничен. Рекомендуемая доза препарата при лечении кровотечений, обусловленных локальным и генерализованным фибринолизом, составляет 20 мг/кг/сутки.

Применение препарата у особых групп пациентов

Нарушение функции почек

У пациентов с легким и умеренным нарушением выделительной функции почек необходима коррекция дозы и кратности приема транексамовой кислоты:

Концентрация креатинина в сыворотке крови	Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)	Доза транексамовой кислоты	Кратность приема
120-249 мкмоль/л (1,36-2,82 мг/дл)	60-89 мл/мин/1,73м ²	15 мг/кг массы тела	2 раза в сутки
250-500 мкмоль/л (2,83-5,66 мг/дл)	30-59 мл/мин/1,73м ²	15 мг/кг массы тела	1 раз в сутки

Нарушение функции печени

У пациентов с нарушением функции печени коррекция дозы не требуется.

Пожилой возраст

У пожилых пациентов при отсутствии

Дети старше 1 года

Опыт применения препаратов транексамовой кислоты у детей ограничен. Рекомендуемая доза препарата при лечении кровотечений, обусловленных локальным и генерализованным фибринолизом, составляет 20 мг/кг/сутки.

Применение препарата у особых групп пациентов

Нарушение функции почек

У пациентов с легким и умеренным нарушением выделительной функции почек необходима коррекция дозы и кратности приема транексамовой кислоты:

Концентрация креатинина в сыворотке крови	Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)	Доза транексамовой кислоты	Кратность приема
120-249 мкмоль/л (1,36-2,82 мг/дл)	60-89 мл/мин/1,73м ²	15 мг/кг массы тела	2 раза в сутки
250-500 мкмоль/л (2,83-5,66 мг/дл)	30-59 мл/мин/1,73м ²	15 мг/кг массы тела	1 раз в сутки

Нарушение функции печени

У пациентов с нарушением функции печени коррекция дозы не требуется.

Пожилой возраст

У пожилых пациентов при отсутствии

почечной недостаточности коррекция дозы
не требуется.

почечной недостаточности коррекция дозы
не требуется.

По доверенности АО «Нижфарм»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Е.А. Агафонова".

Е.А. Агафонова