

ИНСТРУКЦИЯ
 ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Трайкор
 наименование лекарственного препарата

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 145мг
 лекарственная форма, дозировка
Эбботт Лэбораториз ГмбХ, Германия
 наименование владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата

Изменение № 1

280819

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждая таблетка содержит: Действующее вещество: фенофибрат (микроинизированный) 145,0 мг. Вспомогательные вещества: сахараза - 145,0 мг; натрия лаурилсульфат - 10,2 мг; лактозы моногидрат - 132,0 мг; кросповидон - 75,5 мг; целлюлоза микрокристаллическая - 84,28 мг; кремния диоксид коллоидный - 1,72 мг; гипромеллоза - 29,0 мг; докызат натрия - 2,9 мг; магния стеарат - 0,9 мг. Пленочная оболочка: Опадрай® ОУ-В-28920: [поливиниловый спирт - 11,43 мг; титана диоксид - 8,03 мг; тальк -	Состав Каждая таблетка содержит: Действующее вещество: фенофибрат (микроинизированный) 145,0 мг. Вспомогательные вещества: сахараза - 145,0 мг; натрия лаурилсульфат - 10,2 мг; лактозы моногидрат - 132,0 мг; кросповидон - 75,5 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная — 86,0 мг; гипромеллоза - 29,0 мг; докызат натрия - 2,9 мг; магния стеарат - 0,9 мг. Пленочная оболочка: Опадрай® ОУ-В-28920: [поливиниловый спирт - 11,43 мг; титана диоксид - 8,03 мг; тальк -

5,02 мг; лецитин соевый - 0,50 мг; камедь ксантановая - 0,12 мг] - 25,1 мг.	5,02 мг; лецитин соевый - 0,50 мг; камедь ксантановая - 0,12 мг] - 25,1 мг.
--	--

Старший менеджер департамента регистрации
ООО «Эбботт Лэбораториз»



Щуклин М.