

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Трайкор®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145 мг

Фурнье Лабораториз Ирлэнд Лимитед, Ирландия
АО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждая таблетка содержит: <u>Действующее вещество:</u> фенофибрат (микронизированный) 145,0 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> сахароза — 145,0 мг; натрия лаурилсульфат — 10,2 мг; лактозы моногидрат — 132,0 мг; кросповидон — 75,5 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная — 86,0 мг; гипромеллоза — 29,0 мг; докузат натрия — 2,9 мг; магния стеарат — 0,9 мг. <u>Пленочная оболочка Опадрай® ОУ-В-28920:</u> [поливиниловый спирт - 11,43 мг; титана диоксид — 8,03 мг; тальк — 5,02 мг; лецитин соевый — 0,50 мг; камедь ксантановая — 0,12 мг] — 25,1 мг.	Состав Каждая таблетка содержит: <u>Действующее вещество:</u> фенофибрат (микронизированный) 145,0 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> сахароза — 145,0 мг; натрия лаурилсульфат — 10,2 мг; лактозы моногидрат — 132,0 мг; кросповидон — 75,5 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная — 86,0 мг; гипромеллоза — 29,0 мг; докузат натрия — 2,9 мг; магния стеарат — 0,9 мг. <u>Смесь для покрытия пленочной оболочкой белого цвета:</u> [поливиниловый спирт - 11,43 мг; титана диоксид — 8,03 мг; тальк — 5,02 мг; лецитин соевый — 0,50 мг; камедь ксантановая — 0,12 мг] — 25,1 мг.

Специалист по регистрации
ООО «Эбботт Лэбораториз»



Титова И.Н.