

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Квинагут®

торговое наименование лекарственного препарата

Азапентацен

международное непатентованное или группировочное или химическое
наименование

капли глазные, 0,015 %

лекарственная форма, дозировка

ООО Фирма «ФЕРМЕНТ», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Квинагут®	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АЗАПЕНТАЦЕН
Торговое наименование: Квинагут®	Торговое наименование: АЗАПЕНТАЦЕН
Применение при беременности и в	Применение при беременности и в

Старая редакция	Новая редакция
период грудного вскармливания <u>Фертильность</u> Исследования по оценке влияния препаратов азапентацена для местного офтальмологического применения на фертильность не проводились. <u>Беременность</u> Данные об применении препаратов азапентацена для местного офтальмологического применении у беременных женщин отсутствуют либо ограничены. Применение препарата Квинагут® для лечения беременных возможно только по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. <u>Период грудного вскармливания</u> В настоящее время неизвестно, выводится ли азапентацен и/или метаболиты с грудным молоком человека после местного офтальмологического применении, однако риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании, нельзя исключать. Не рекомендуется применение	период грудного вскармливания <u>Фертильность</u> Исследования по оценке влияния препаратов азапентацена для местного офтальмологического применения на фертильность не проводились. <u>Беременность</u> Данные об применении препаратов азапентацена для местного офтальмологического применении у беременных женщин отсутствуют либо ограничены. Применение препарата АЗАПЕНТАЦЕН для лечения беременных возможно только по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. <u>Период грудного вскармливания</u> В настоящее время неизвестно, выводится ли азапентацен и/или метаболиты с грудным молоком человека после местного офтальмологического применении, однако риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании, нельзя исключать.

Старая редакция	Новая редакция
препарата в период грудного вскармливания.	Не рекомендуется применение препарата в период грудного вскармливания.
Особые указания Квинагут® предназначен для длительной терапии. Не рекомендуется прерывать лечение даже в случае быстрого улучшения. Квинагут® не предназначен для терапии стадий катаракты, при которых требуется хирургическое вмешательство. Пациентам, использующим контактные линзы, перед применением препарата следует снять линзы и установить их обратно не ранее, чем через 15 минут после закапывания препарата. Квинагут® содержит тиомерсал (ртуть-органическое вещество) в качестве консерванта и может вызывать аллергические реакции. Препарат также содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат в качестве консервантов, которые также могут вызывать аллергические реакции (возможно, реакции	Особые указания АЗАПЕНТАЦЕН предназначен для длительной терапии. Не рекомендуется прерывать лечение даже в случае быстрого улучшения. АЗАПЕНТАЦЕН не предназначен для терапии стадий катаракты, при которых требуется хирургическое вмешательство. Пациентам, использующим контактные линзы, перед применением препарата следует снять линзы и установить их обратно не ранее, чем через 15 минут после закапывания препарата. АЗАПЕНТАЦЕН содержит тиомерсал (ртуть-органическое вещество) в качестве консерванта и может вызывать аллергические реакции. Препарат также содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат в качестве консервантов, которые также могут вызывать аллергические

Старая редакция	Новая редакция
замедленного типа). Флакон необходимо закрывать после каждого применения. Не следует прикасаться кончиком пипетки к каким-либо поверхностям.	реакции (возможно, реакции замедленного типа). Флакон необходимо закрывать после каждого применения. Не следует прикасаться кончиком пипетки к каким-либо поверхностям.
Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии: Общество с ограниченной ответственностью «Фармактив», Россия. 123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, 6-й этаж, пом. I, ком. 17. Тел.: +7 (495) 363-69-38.	Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей: Общество с ограниченной ответственностью «КВИНАКС», Российская Федерация. 123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, этаж 6, помещ. I, ком. 20. Тел.: +7 (495) 363-69-38.

Генеральный директор
ООО «КВИНАКС»



Баландина И. В.