МИНЗДРАВ РОССИИ
П N012124/02- 110216
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Амоксиклав®

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения

500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг

Лек д.д., Словения

Изменение № 1

Срок введения изменений с «__»_110216_____ 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания • повышенная чувствительность к амоксициллину, клавулановой кислоте, другим компонентам препарата; • тяжелые реакции гиперчувствительности (например, анафилактические реакции) в анамнезе к другим бета-лактамным антибиотикам (цефалоспорин, карбапенем или монобактам); • холестатическая желтуха и/или другие нарушения функции печени, вызванные приемом	**Противопоказания** • повышенная чувствительность к амоксициллину и другим пенициллинам, клавулановой кислоте, другим компонентам препарата; • тяжелые реакции гиперчувствительности (например, анафилактические реакции) в анамнезе к другим бета-лактамным антибиотикам (цефалоспорин, карбапенем или монобактам); • холестатическая желтуха и/или другие нарушения функции

амоксициллина/клавулановой кислоты, в анамнезе; • детский возраст до 2 лет.	печени, вызванные применением амоксициллина/клавулановой кислоты, в анамнезе.

Руководитель группы поддержания
зарегистрированных продуктов
ЗАО «Сандоз»

Никинен С.В.