МИНЗДРАВ РОССИИ
П №012124/02-170322
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ
# ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Амоксиклав®**

наименование лекарственного препарата

**порошок для приготовления раствора для внутривенного введения,**
**500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг**

лекарственная форма, дозировка

**Сандоз ГмбХ, Австрия**

наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «___»_____17.03.22_____ 20___г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Показания к применению**<br>Инфекции, вызванные чувствительными к комбинации амоксициллина с клавулановой кислотой штаммами микроорганизмов (в т.ч. смешанные инфекции, вызванные | **Показания к применению**<br>Препарат Амоксиклав® показан для лечения бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к амоксициллину/клавулановой кислоте микроорганизмами:<br>• инфекции верхних дыхательных |

| | |
|---|---|
| грамотрицательными и грамположительными аэробамии и анаэробами):<br>• инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (острый и хронический синусит, острый и хронический средний отит, тонзиллит);<br>• инфекции нижних дыхательных путей (обострение хронического бронхита, долевая пневмония и бронхопневмония);<br>• инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит);<br>• инфекции в гинекологии;<br>• инфекции кожи и мягких тканей, включая укусы человека и животных;<br>• инфекции костей и суставов (например, остеомиелит);<br>• инфекции брюшной полости, в т.ч. желчных путей (холецистит, холангит);<br>• инфекции, передаваемые половым путем (гонорея, мягкий шанкр);<br>• профилактика инфекций после хирургических вмешательств. | путей (включая инфекции ЛОР-органов), например, рецидивирующий тонзиллит, синусит, средний отит, обычно вызываемые *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*[#], *Moraxella catarrhalis*[#] и *Streptococcus pyogenes*;<br>• инфекции нижних дыхательных путей, например, обострения хронического бронхита, долевая пневмония и бронхопневмония, обычно вызываемые *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*[#] и *Moraxella catarrhalis*[#];<br>• инфекции мочеполового тракта, например, цистит, уретрит, пиелонефрит, инфекции женских половых органов, обычно вызываемые видами семейства *Enterobacteriaceae*[#] (преимущественно *Escherichia coli*[#]), *Staphylococcus saprophyticus* и видами рода *Enterococcus*, а также гонорея, вызываемая *Neisseria gonorrhoeae*[#]; |

| | |
|---|---|
| | • инфекции кожи и мягких тканей, обычно вызываемые *Staphylococcus aureus*[#], *Streptococcus pyogenes* и видами рода *Bacteroides*[#]; в частности целлюлит, инфекции после укусов животных, тяжелый дентальный абсцесс с переходом в целлюлит;<br>• инфекции костей и суставов, например, остеомиелит, обычно вызываемый *Staphylococcus aureus*[#]; при необходимости возможно проведение более длительной терапии;<br>• другие смешанные инфекции (например, септический аборт, послеродовой сепсис, интраабдоминальный сепсис, сепсис, перитонит, послеоперационные инфекции) в рамках ступенчатой терапии;<br>• профилактика послеоперационных инфекций при хирургических вмешательствах на желудочно-кишечном тракте, органах малого таза, голове и шее, сердце, почках, |

| | |
|---|---|
| | желчевыводящих путях, а также при имплантации искусственных суставов.<br>#Отдельные представители указанного рода микроорганизмов продуцируют бета-лактамазу, что делает их нечувствительными к монотерапии амоксициллином.<br>Чувствительность бактерий к комбинации амоксициллина с клавулановой кислотой варьирует в зависимости от региона и с течением времени. Там, где это возможно, должны быть приняты во внимание локальные данные по чувствительности. В случае необходимости следует осуществлять сбор микробиологических образцов и проводить анализ на бактериологическую чувствительность. |
| **Противопоказания**<br>• повышенная чувствительность к амоксициллину и другим пенициллинам, клавулановой | **Противопоказания**<br>• Гиперчувствительность к амоксициллину и другим пенициллинам, клавулановой |

| | |
|---|---|
| кислоте, другим компонентам препарата;<br>• тяжелые реакции гиперчувствительности (например, анафилактические реакции) в анамнезе к другим бета-лактамным антибиотикам (цефалоспорин, карбапенем или монобактам);<br>• холестатическая желтуха и/или другие нарушения функции печени, вызванные применением амоксициллина/клавулановой кислоты, в анамнезе. | кислоте, другим компонентам препарата;<br>• тяжелые реакции гиперчувствительности немедленного типа (например, анафилактические реакции) в анамнезе к другим бета-лактамным антибиотикам (например, цефалоспорины, карбапенемы или монобактамы);<br>• предшествующие эпизоды желтухи или нарушение функции печени при применении амоксициллина/клавулановой кислоты в анамнезе. |
| ***Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:***<br>125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3;<br>телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10. | **Организация, принимающая претензии потребителей**<br>АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70;<br>телефон: (495) 660 75 09; факс: (495) 660 75 10. |

Директор департамента
по разработке продуктов
АО «Сандоз»

Горожанин А.В.