

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

бенфо-Бинавит

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг + 100 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

290621

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка <i>Симптомы передозировки.</i> Учитывая широкий терапевтический диапазон, передозировка бенфотиамина при приеме внутрь является маловероятной. Прием высоких доз пиридоксина (витамина В₆) в течение короткого промежутка времени (в дозе более 1 г в сутки) может привести к кратковременному появлению нейротоксических эффектов. При применении препарата в дозе 100 мг в сутки на протяжении более 6 месяцев также возможно развитие нейропатий. Передозировка, как правило, проявляется в виде развития сенсорной полинейропатии, которая может сопровождаться атаксией. Прием препарата в крайне высоких дозах может приводить к конвульсиям. <i>Лечение.</i> При приеме пиридоксина в дозе, превышающей 150 мг/кг массы тела, рекомендуется вызвать рвоту и принять активированный уголь. Провокация рвоты наиболее эффективна в течение первых 30 минут после приема	Передозировка <i>Симптомы передозировки.</i> Учитывая широкий терапевтический диапазон, передозировка бенфотиамина при приеме внутрь является маловероятной. Прием высоких доз пиридоксина (витамина В₆) в течение короткого промежутка времени (в дозе более 1 г в сутки) может привести к кратковременному появлению нейротоксических эффектов. При применении препарата в дозе 100 мг в сутки на протяжении более 6 месяцев также возможно развитие нейропатий. Передозировка, как правило, проявляется в виде развития сенсорной полинейропатии, которая может сопровождаться атаксией. Прием препарата в крайне высоких дозах может приводить к конвульсиям. <i>Лечение.</i> При приеме пиридоксина в дозе, превышающей 150 мг/кг массы тела, рекомендуется вызвать рвоту и принять активированный уголь. Провокация рвоты наиболее эффективна в течение первых 30 минут после приема

Старая редакция	Новая редакция
препарата. Может потребоваться принятие экстренных мер. Особые указания При применении препарата в дозе 100 мг в сутки на протяжении более 6 месяцев возможно развитие сенсорной периферической нейропатии. Во время приема препарата бенфо-Бинавит рекомендуется прием поливитаминных комплексов, включающих в состав витамины группы В. Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение / Организация, принимающая претензии: ЗАО «Бинергия», Россия, 143910, Московская область, г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 1 Тел.: 8-495-580-55-02 Факс: 8-495-580-55-03	препарата. Может потребоваться принятие экстренных мер. Особые указания При применении препарата в дозе 100 мг в сутки на протяжении более 6 месяцев возможно развитие сенсорной периферической нейропатии. Во время приема препарата бенфо-Бинавит рекомендуется прием поливитаминных комплексов, включающих в состав витамины группы В. Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение / Организация, принимающая претензии: АО «Бинергия» Россия, 143910, Московская область, г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 1 Тел.: 8-495-580-55-02 Факс: 8-495-580-55-03

Медицинский директор
АО «Бинергия»

Ханина Н.Ю.



Ханина Н.Ю.