

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

бенфо-Бинавит

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой

100 мг + 100 мг

лекарственная форма, дозировка

МИНЗДРАВ РОССИИ

021222
СОГЛАСОВАНО

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «__» 02.12.22 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: <i>Действующие вещества:</i> бенфотиамин (в пересчете на 100 % вещество) – 100 мг, пиридоксина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) – 100 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 102 – 222,0 мг, повидон-К30 – 8,0 мг, омега-3 триглицериды – 5,0 мг, кремния диоксид коллоидный – 7,0 мг, кармеллоза натрия – 3,0 мг, тальк – 5,0 мг; <i>состав оболочки:</i> шеллак – 3,0 мг, сахароза – 92,399 мг, кальция карбонат – 91,675 мг, тальк – 55,130 мг, акации камедь – 14,144 мг, крахмал кукурузный – 10,230 мг, титана диоксид – 14,362 мг, кремния диоксид коллоидный – 6,138 мг, повидон-К30 – 7,865 мг, макрогол-6000 – 2,023 мг, глицерол 85 % – 2,865 мг, полисорбат-80 – 0,169 мг, воск белый – 0,120 мг.	Состав 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: <i>действующие вещества:</i> бенфотиамин (в пересчете на 100 % вещество) – 100,000 мг, пиридоксина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) – 100,000 мг. <i>вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая – 222,000 мг, повидон К30 – 8,000 мг, омега-3 триглицериды – 5,000 мг, кремния диоксид коллоидный – 7,000 мг, кроскармеллоза натрия – 3,000 мг, тальк – 5,000 мг; <i>состав оболочки:</i> шеллак – 3,000 мг, сахароза – 233,505 мг, тальк – 4,641 мг, титана диоксид – 4,925 мг, кремния диоксид коллоидный – 3,840 мг, повидон K17 – 3,690 мг, полисорбат-80 – 0,169 мг, магния карбонат (тяжелый) – 45,880 мг, карнаубский воск (Капол 1400) – 0,470 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг + 100 мг. По 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой для упаковки или гибкой упаковки в рулонах на основе алюминиевой фольги для лекарственных препаратов. По 2 или 4 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Срок годности 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг + 100 мг. По 10 или 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой для упаковки или гибкой упаковки в рулонах на основе алюминиевой фольги для лекарственных препаратов. По 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 2, 4 контурных ячейковых упаковок по 15 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Медицинский директор
АО «Бинергия»



Ханина Н.Ю.