

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Регистрационный номер: ЛП-000082

Торговое название: Перекись водорода.

Международное непатентованное название или группировочное название: водорода пероксид.

Химическое название: гидрогенпероксид.

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения.

Состав

100 мл раствора содержат:

активное вещество:

водорода перекись медицинская – от 7,5 до 11 г в зависимости от содержания
водорода пероксида в исходном препарате,
эквивалентно содержанию водорода пероксида – 3,0 г

вспомогательные вещества:

натрия бензоат – 0,05 г
вода очищенная – до 100 мл

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакологическая группа:

Антисептическое средство.

КОД АТХ: [D08AX01]

Фармакологические свойства*Фармакодинамика*

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (белки, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, ангина, тонзиллит, гинекологические заболевания.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

С осторожностью

Декомпенсированные заболевания печени и почек, гипертиреоз, герпетиформный дерматит.

Применение при беременности и лактации

Применение возможно, если потенциальная польза для матери, превышает возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Для наружного применения применяют 3 % раствор, местно – для полоскания рта и горла, нанесения на слизистые оболочки – 0,25 % раствор (3% раствор разводят водой в соотношении 1:11). Неразбавленный раствор не применяют для обработки слизистых оболочек.

Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом. Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Побочное действие

Жжение в момент обработки пораженных участков кожи или слизистых оболочек, аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат под окклюзионные повязки.

Следует избегать попадания в глаза!

Не применять для орошения полостей!

Обработка раны раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и других раневых инфекций.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не изучалось.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 3 %.

По 40 мл, 100 мл во флаконы стеклянные с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

По 2 мл, 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с клапаном из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления, или из полиэтилена для медицинских целей.

На флаконы, тубик-капельницы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной, писчей или текст этикетки наносят непосредственно на тубик-капельницу методом каплеструйной печати.

Каждый флакон или 5 тубик-капельниц по 2 мл, 5 мл, 10 мл, или 10 тубик-капельниц по 2 мл, 5 мл, 10 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Флаконы с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

ЗАО "Производственная фармацевтическая компания Обновление"

633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18;

630071, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, д. 80,

тел./факс (383) 359-11-99

Генеральный директор

ЗАО «ПФК Обновление»



В. Б. Калустов