

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Интестифаг®**

Интести-бактериофаг

раствор для приема внутрь и ректального введения

АО «НПО «Микроген»

Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, стр. 2

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. В 1 мл препарата содержится: <i>Действующее вещество.</i> Стерильные очищенные фильтраты фаголизатов <i>S. flexneri</i> 1, 2, 3, 4 серотипов (с активностью по Аппельману - не менее 10^{-6}), <i>S. sonnei</i>, <i>S. typhimurium</i> (с активностью по Аппельману - не менее 10^{-5}), <i>S. flexneri</i> 6 серотипа, остальных серотипов <i>Salmonella</i>, <i>E. coli</i>, <i>Proteus</i>, <i>Enterococcus</i>, <i>Staphylococcus</i>, <i>P. aeruginosa</i> (с активностью по Аппельману - не менее 10^{-4}) – до 1 мл.	Состав. В 1 мл препарата содержится: <i>Действующее вещество.</i> Стерильные очищенные фильтраты фаголизатов <i>S. flexneri</i> 1, 2, 3, 4 серотипов (с активностью по Аппельману - не менее 10^{-6}), <i>S. sonnei</i>, <i>S. typhimurium</i> (с активностью по Аппельману - не менее 10^{-5}), <i>S. flexneri</i> 6 серотипа, остальных серотипов <i>Salmonella</i>, <i>E. coli</i>, <i>Proteus</i>, <i>Enterococcus</i>, <i>Staphylococcus</i>, <i>P. aeruginosa</i> (с активностью по Аппельману - не менее 10^{-4}) – до 1 мл.

Вспомогательные вещества.	Вспомогательные вещества.
Консервант - 8-гидрокси-хинолина сульфат или 8-гидроксихинолина сульфата моногидрат в пересчете на 8-гидроксихинолина сульфат - 0,0001 г/мл (содержание расчетное).	8-гидроксихинолина сульфат (спецификация производителя)/8-гидроксихинолина сульфата моногидрат (спецификация производителя) в пересчете на 8-гидроксихинолина сульфат - 0,0001 г/мл (содержание расчетное).

Представитель АО «НПО «Микроген»
по доверенности

 М.А. Лодочникова

