

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Юнивит® Кальций Д₃ для малышей
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг+50 МЕ/5 мл

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 8

24 08 22

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 43,0 г порошка: <i>действующие вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 10,0 г (4,0 г); колекальциферол (в пересчете на 100 % колекальциферол) – 0,027 мг (1000 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат, воду; <i>вспомогательные вещества:</i> сорбитол (сорбит) – 29,585 г, крахмал прежелатинизированный картофельный (преджель) – 3,0 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,215 г, ароматизатор апельсиновый – 0,2 г. Состав на 5 мл суспензии: <i>действующие вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 500 мг (200 мг); колекальциферол (в пересчете на 100 %	Состав на 1 мл препарата: <i>Действующие вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 0,1 г (40 мг); колекальциферол (в пересчете на 100 % колекальциферол) – 0,27 мкг (10 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, крахмал кукурузный, кальция фосфат (Е 341), воду очищенную; <i>Вспомогательные вещества:</i> сорбитол – 295,85 мг, крахмал прежелатинизированный – 30,0 мг, кремния диоксид коллоидный – 2,15 мг, ароматизатор апельсиновый – 2,0 мг.

Старая редакция	Новая редакция
колекальциферол) – 0,00135 мг (50 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат, воду; <i>вспомогательные вещества:</i> сорбитол (сорбит) – 1,479 г, крахмал прежелатинизированный картофельный (преджель) – 0,15 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,0108 г, ароматизатор апельсиновый – 0,01 г. Форма выпуска Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг+50 МЕ/5 мл. По 43,0 г во флаконы на 100 мл из темного (янтарного) стекла. Один флакон вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой помещают в пачку из картона. Условия хранения Хранить при температуре не выше 25 °С. Приготовленную суспензию хранить при температуре не выше 15 ° (в холодильнике). Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.	Форма выпуска Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 40 мг/1 мл+10 МЕ/1 мл. По 43,0 г во флаконы из темного (янтарного стекла) 3 гидролитического класса вместимостью 100 мл, укупоренные крышками. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку или этикетку из бумаги этикеточной или писчей. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой из полипропилена помещают в пачку из картона. Условия хранения Хранить при температуре не выше 25 °С. Приготовленную суспензию хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Старая редакция	Новая редакция
Срок годности 3 года. Приготовленную суспензию хранить не более 20 дней. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.	Срок годности Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь - 3 года. Приготовленная суспензия - не более 60 сут. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек Без рецепта.	Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Представитель
АО "Отисифарм"



Е.В. Толстова