

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Юнивит® Кальций Дз для малышей,
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 40 мг/1 мл+10 МЕ/1 мл

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 9

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 40 мг/1 мл+10 МЕ/1 мл. По 43,0 г во флаконы из темного (янтарного стекла) 3 гидролитического класса вместимостью 100 мл, укупоренные крышками. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку или этикетку из бумаги этикеточной или писчей. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой из полипропилена помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 40 мг/1 мл+10 МЕ/1 мл. По 43,0 г во флаконы из темного (янтарного) стекла 3 гидролитического класса вместимостью 100 мл или во флаконы из темного (янтарного) стекла 2 гидролитического класса вместимостью 100 мл, укупоренные крышками. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку или этикетку из бумаги этикеточной или писчей. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой из полипропилена помещают в пачку из картона.

Представитель
АО "Отисифарм"

Е.В. Толстова