МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-006678-200821
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**КОЛХИЦИН**

торговое наименование лекарственного препарата

**таблетки, 1 мг**

лекарственная форма, дозировка

**ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия**

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения изменения «_____»_____20___ г. 200821

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<br><br>ИНСТРУКЦИЯ<br>по медицинскому применению лекарственного препарата<br><br>**КОЛХИЦИН**<br><br>**Торговое наименование:**<br>КОЛХИЦИН<br>**Особые указания**<br>При применении Колхицина очень важно соблюдать рекомендуемую дозировку. Лечение необходимо проводить под тщательным гематологическим и клиническим контролем. | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<br><br>ИНСТРУКЦИЯ<br>ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА<br><br>**КОЛХИЦИН ЛИРКА**<br><br>**Торговое наименование:**<br>КОЛХИЦИН **ЛИРКА**<br>**Особые указания**<br>При применении **препарата КОЛХИЦИН ЛИРКА** очень важно соблюдать рекомендуемую дозировку. Лечение необходимо проводить под тщательным гематологическим и клиническим контролем. |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| При появлении выраженных побочных эффектов со стороны ЖКТ следует уменьшить дозу или отменить препарат.<br>При снижении количества лейкоцитов ниже 3000/мкл и тромбоцитов ниже 100000/мкл прием прекращают до нормализации картины крови.<br>Колхицин необходимо назначать с особой осторожностью для приема пожилыми и ослабленными пациентами, в особенности страдающими заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта и сердца. При появлении слабости, анорексии, тошноты, рвоты или диареи дозировку необходимо снизить или отменить, так как это может быть первыми признаками интоксикации.<br>***Кларитромицин:*** сообщалось о пострегистрационных случаях токсичности колхицина при сочетанном применении колхицина и кларитромицина, особенно у пожилых пациентов; некоторые из этих случаев отмечались у пациентов с почечной недостаточностью. Были зарегистрированы случаи смерти некоторых из этих пациентов. При необходимости приема колхицина одновременно с кларитромицином пациент должен находиться под тщательным наблюдением во избежание появления клинических симптомов токсичности, вызванных приемом колхицина. | При появлении выраженных побочных эффектов со стороны ЖКТ следует уменьшить дозу или отменить препарат.<br>При снижении количества лейкоцитов ниже 3000/мкл и тромбоцитов ниже 100000/мкл прием прекращают до нормализации картины крови.<br>**Препарат КОЛХИЦИН ЛИРКА** необходимо назначать с особой осторожностью для приема пожилыми и ослабленными пациентами, в особенности страдающими заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта и сердца. При появлении слабости, анорексии, тошноты, рвоты или диареи дозировку необходимо снизить или отменить, так как это может быть первыми признаками интоксикации.<br>***Кларитромицин:*** сообщалось о пострегистрационных случаях токсичности колхицина при сочетанном применении колхицина и кларитромицина, особенно у пожилых пациентов; некоторые из этих случаев отмечались у пациентов с почечной недостаточностью. Были зарегистрированы случаи смерти некоторых из этих пациентов. При необходимости приема препарата **КОЛХИЦИН ЛИРКА** одновременно с кларитромицином пациент должен находиться под тщательным наблюдением во избежание появления клинических симптомов токсичности, вызванных приемом колхицина. |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| ***Колхицин содержит лактозу и сахарозу:*** пациенты, страдающие от редких генетических заболеваний, включающих непереносимость галактозы, фруктозы, лактозную или сахаразо-изомальтазную недостаточность, глюкозо-галактозную мальабсорбцию, не должны принимать данный лекарственный препарат. | *Препарат* ***КОЛХИЦИН ЛИРКА содержит лактозу и сахарозу:*** пациенты, страдающие от редких генетических заболеваний, включающих непереносимость галактозы, фруктозы, лактозную или сахаразо-изомальтазную недостаточность, глюкозо-галактозную мальабсорбцию, не должны принимать данный лекарственный препарат. |

Начальник отдела регистрации
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика» Н.А. Шишкин