

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Элькап®

раствор для приема внутрь 300 мг/мл

ООО «ПИК-ФАРМА», Россия

**произведено ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», Россия
или ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», Россия**

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « » 30 12 11 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска: Раствор для приема внутрь 300 мг/мл. <i>100 мл стеклянный флакон. По 100 мл во флаконы тёмного стекла.</i> На флакон надевается мерный стаканчик объемом 20 мл. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>50 мл стеклянный флакон. По 50 мл во флаконы тёмного стекла.</i> Каждый флакон вместе с мерной	Форма выпуска Раствор для приема внутрь 300 мг/мл. <i>100 мл стеклянный флакон. По 100 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с контрольным кольцом первого вскрытия. На флакон надевается мерный стаканчик объемом 20 мл.</i> Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>50 мл стеклянный флакон. По 50 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные</i>

Изменение № 3 к Инструкции на Элькар® раствор для приема внутрь 300 мг/мл С.2

ложкой номинальным объемом 5 мл и с риской с маркировкой « $\frac{1}{2}$ » (что соответствует 2,5 мл) или с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл с рисками с маркировкой « $\frac{1}{4}$ » и « $\frac{1}{2}$ » (что соответствует 1,25 мл и 2,5 мл), с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	крышками с капельницами с контрольным кольцом первого вскрытия. Каждый флакон вместе с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл с рисками с маркировкой « $\frac{1}{4}$ » и « $\frac{1}{2}$ » (что соответствует 1,25 мл и 2,5 мл), с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
25 мл стеклянный флакон. По 25 мл во флаконы-капельницы темного стекла. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	25 мл стеклянный флакон. По 25 мл во флаконы темного стекла, укупоренные крышками с капельницами с контрольным кольцом первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
25 мл пластиковый флакон. По 25 мл во флаконы пластиковые. 10 или 20 пластиковых флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с перегородками из картона.	25 мл пластиковый флакон. По 25 мл во флаконы пластиковые, укупоренные крышками с контрольным кольцом первого вскрытия. 10 или 20 пластиковых флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с перегородками из картона.

Генеральный директор

ООО «ПИК-ФАРМА»



Н.П. Борисоглебский