



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Элькар®

раствор для приёма внутрь 300 мг/мл

ООО «ПИК-ФАРМА», Россия

Произведено: ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», Россия,

ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК», Россия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « 01 04 19 » 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата ЭЛЬКАР®	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЭЛЬКАР®
Торговое название препарата: Элькар®.	Торговое наименование препарата: Элькар®
Международное непатентованное название: левокарнитин.	Международное непатентованное наименование: левокарнитин
Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Допускается наличие специфического запаха.	Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Допускается наличие характерного запаха.
Состав: действующее вещество: Левocarнитин (Карнифит) 300 мг; вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат 1,2 мг, метилпарагидроксибензоат 0,5 мг,	Состав: 1 мл препарата содержит: действующее вещество: Левocarнитин (Карнифит) 300 мг; вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат 1,2 мг,

Старая редакция	Новая редакция
пропилпарагидроксibenзоат 0,2 мг, воды очищенной до 1 мл.	метилпарагидроксibenзоат 0,5 мг, пропилпарагидроксibenзоат 0,2 мг, воды очищенной до 1 мл.
Особые указания Лечение детей в возрасте до 3-х лет осуществлять под наблюдением врача. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.)	Особые указания Лечение детей в возрасте до 3-х лет осуществлять под наблюдением врача.
Раздел отсутствует	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
Форма выпуска Раствор для приема внутрь 300 мг/мл. 100 мл стеклянный флакон. По 100 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с контрольным кольцом первого вскрытия. На флакон надевается мерный стаканчик объемом 20 мл. Каждый флакон вместе с инструкцией по	Форма выпуска Раствор для приема внутрь 300 мг/мл. 100 мл стеклянный флакон. По 100 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с контрольным кольцом первого вскрытия. На флакон надевается мерный стаканчик объемом 20 мл. Каждый флакон вместе с инструкцией по

Старая редакция	Новая редакция
применению помещают в пачку из картона. <i>50 мл стеклянный флакон.</i> По 50 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с капельницами с контрольным кольцом первого вскрытия. Каждый флакон вместе с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл с рисками с маркировкой «$\frac{1}{4}$» и «$\frac{1}{2}$» (что соответствует 1,25 мл и 2,5 мл), с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>25 мл стеклянный флакон.</i> По 25 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с капельницами с контрольным кольцом первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>25 мл пластиковый флакон.</i> По 25 мл во флаконы пластиковые, укупоренные крышками с контрольным кольцом первого вскрытия. 10 или 20 пластиковых флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с перегородками из картона.	применению помещают в пачку из картона. <i>50 мл стеклянный флакон.</i> По 50 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с капельницами с контрольным кольцом первого вскрытия. Каждый флакон вместе с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл с рисками с маркировкой «$\frac{1}{4}$» и «$\frac{1}{2}$» (что соответствует 1,25 мл и 2,5 мл), с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>25 мл стеклянный флакон.</i> По 25 мл во флаконы тёмного стекла, укупоренные крышками с капельницами с контрольным кольцом первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения В защищённом от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. После вскрытия – в холодильнике в течение 2 мес.	Условия хранения В защищённом от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакона – при температуре от 2 до 8 °С в течение 2 месяцев.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение ООО «ПИК-ФАРМА», Россия, 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 25, стр. 1.
Производитель ООО «ПИК-ФАРМА», 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 25, стр. 1. Произведено: ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмолловский, здание цеха № 92.	Производитель ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», Россия, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Кузьмолловский, ул. Заводская, зд. 6 или ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский район, пос. Северный, ул. Берёзовая, 1/19.
Организация, принимающая претензии ООО «ПИК-ФАРМА». Тел./факс: (495) 925-57-00. www.elkar.ru	Организация, принимающая претензии ООО «ПИК-ФАРМА». Тел./факс: (495) 925-57-00 www.pikfarma.ru www.elkar.ru

Генеральный директор
ООО «ПИК-ФАРМА»



Г.А. Прокофьева