

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Элькар®

раствор для приема внутрь 300 мг/мл

ООО «ПИК-ФАРМА», Россия

Произведено: ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК», Россия

МИНЗДРАВ РОССИИ

22 07 22
СОГЛАСОВАНО

Изменение № 9

Дата внесения Изменения «___» 22 07 22 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Возможны аллергические реакции, гастралгия, диспепсия, миастения (у пациентов с уреимией).	Побочное действие Нежелательные реакции перечислены в соответствии с поражением органов и систем и частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечасто (от $\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$), редко (от $\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$), очень редко ($< 1/10\ 000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно). <i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта**</i> : частота неизвестна – тошнота, рвота, боли в животе, диарея. При этих проявлениях отмена препарата не требуется. <i>Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани</i> : частота неизвестна – миастения (у пациентов с уреимией).

Старая редакция	Новая редакция
	<i>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей*</i>: частота неизвестна – кожная сыпь, крапивница, отек лица, гиперемия лица. <i>Общие нарушения и реакции в месте введения</i>: частота неизвестна – необычный запах тела («рыбный запах» от тела) **. *При возникновении данных симптомов необходимо отменить лекарственный препарат и обратиться к врачу. **Снижение дозы может уменьшать или устранять связанный с приемом лекарственного препарата необычный запах тела («рыбный запах» от тела) пациента и желудочно-кишечные симптомы. Переносимость следует тщательно контролировать в течение первой недели приема и после любого увеличения дозы.

Генеральный директор
ООО «ПИК-ФАРМА»



Г. А. Ким