



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Марены красильной экстракт

Регистрационный номер: P N001643/01

Торговое наименование: Марены красильной экстракт

Группировочное наименование

Марены корневищ и корней экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав

1 таблетка препарата содержит:

Активный компонент:

Марены корневищ и корней экстракт (с содержанием суммы антрагликозидов в пересчете на руберитриновую кислоту и абсолютно сухое вещество 8,6 %)	- 0,250 г
---	-----------

Вспомогательные вещества:

лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный (аэросил А-380), кальция стеарат, кроскармеллоза натрия.

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с риской с одной стороны и фаской с двух сторон, от светло-коричневого цвета с красноватым оттенком или без оттенка до коричневого цвета с красноватым оттенком или без оттенка, с темными и светлыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Спазмолитическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: G04BC

Фармакологические свойства

Основным действующим веществом препарата является марены красильной экстракт сухой, получаемый из корневищ и корней марены красильной - *Rubia tinctorum* L. и ее грузинской разновидности *Rubia tinctorum* L. var. *iberica* Fisch. ex DC. (*R. iberica* (Fisch ex DC.) Koch) семейства мареновые – *Rubiaceae*.

Фармакодинамика

Экстракт марены красильной сухой обладает диуретическим и спазмолитическим действием; благодаря снижению тонуса гладкой мускулатуры с последующим усилением ее перистальтики способствует безболезненному изгнанию мелких мочевых конкрементов (особенно содержащих фосфаты кальция и магния) и песка из почек, подкисляет мочу, приводит к уменьшению болевого синдрома и улучшению общего состояния у пациентов с нефроуролитиазом. В процессе лечения почечные камни становятся рыхлыми и окрашиваются в красноватый цвет.

Фармакокинетика

Препарат представляет собой сухой экстракт корневищ и корней марены красильной и содержит комплекс биологически активных соединений, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

У взрослых пациентов с мочекаменной болезнью (нефроуролитиазом) для уменьшения болей спастического характера и облегчения отхождения мелких камней и песка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый и хронический гломерулонефрит, выраженная почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 2-3 таблеток 3 раза в сутки. Таблетки перед приемом следует растворить в $\frac{1}{2}$ стакана теплой воды.

Курс лечения 20-30 дней. Проведение повторного курса лечения возможно через 4-6 недель после консультации с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При применении препаратов марены красильной моча окрашивается в красноватый цвет; при появлении интенсивного окрашивания мочи в буро-красный цвет необходимо уменьшить дозу или временно прервать курс лечения.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются или Вы заметили любые другие нежелательные реакции не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

Передозировка препарата может вызвать боли, связанные с отхождением конкрементов. При возникновении болей необходимо обратиться к врачу.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности или требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (работа диспетчера/оператора, управление транспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, 250 мг.

По 10 и 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной с термолаковым покрытием.

Одну, две или три контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток или одну контурную ячейковую упаковку по 20 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

