

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЭМОКСИПИН®, капли глазные, 1 %

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»
(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «_____» 16 07 21 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3-30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев или повторяться 2 -3 раза в год. <i>Инструкция по применению крышки-капельницы</i> 1. Снять с флакона алюминиевый колпачок и резиновую пробку, используя ножницы. 2. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая прилагается к флакону, предварительно сняв с нее упаковку. 3. Перевернуть флакон вверх дном и закапать капли, нажав на корпус крышки-капельницы.	Способ применения и дозы Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3-30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев или повторяться 2-3 раза в год. <i>Инструкция по применению крышки-капельницы</i> 1. Снять с флакона алюминиевый колпачок и резиновую пробку, используя ножницы, или алюминиевый колпачок с пластиковой крышкой типа «флип-офф», или комбинированный колпачок, при этом сначала удалить пластиковую крышку, а затем - алюминиевый колпачок вместе с резиновой пробкой, используя ножницы. 2. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая прилагается к

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»



Е.В. Толстова