

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Метопролол ретард-Акрихин

**таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» _____ 20__ г.

010721

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг и 100 мг. По 10 таблеток с дозировками 25 мг и 50 мг в контурной ячейковой упаковке. По 30 таблеток с дозировкой 100 мг в банке из полипропилена (полиэтилена) или флаконе из пластика. Каждая банка или флакон, или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.	Форма выпуска Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг и 100 мг. По 10 таблеток с дозировками 25 мг и 50 мг в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 30 таблеток с дозировкой 100 мг в банку для упаковки лекарственных средств из полипропилена, или в банку из полиэтилена высокого давления, или из полиэтилена низкого давления, или во флакон для лекарственных средств из полиэтилена низкого давления, укупоренные крышкой навинчи-

Старая редакция	Новая редакция
	ваемой или с контролем первого вскрытия, или со встроенным влагопоглотителем. Каждую банку или флакон, или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель фирмы



Е.В. Каткова