

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Отривин Экспресс

наименование лекарственного препарата

Спрей назальный дозированный, 35 мкг/доза,спрей назальный дозированный с ароматом ментола, 35 мкг/доза

лекарственная форма, дозировка

ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Швейцария


наименование фирмы-производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: <i>Спрей назальный дозированный:</i> Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета. <i>Спрей назальный дозированный с ароматом ментола:</i> Прозрачный или опалесцирующий раствор от бесцветного до белого цвета с запахом ментола и эвкалипта.	Описание: <i>Спрей назальный дозированный:</i> Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета. <i>Спрей назальный дозированный с ароматом ментола:</i> От прозрачного до опалесцентного, от бесцветного до белого цвета раствор, с запахом ментола и эвкалипта.
Способ применения и дозы Интраназально. Взрослые и дети старше 12 лет - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-2 раза в день.	Способ применения и дозы Интраназально. Взрослые и дети старше 12 лет - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-2 раза в день.

Старая редакция	Новая редакция
следует. Не допускать попадания спрея в глаза. Чтобы избежать возможного распространения инфекции, препарат должен использовать только один человек. 1. Не срезайте наконечник распылительного устройства.  2. Тщательно прочистите нос. 3. Снимите защитный колпачок. Возьмите флакон вертикально, поддерживая дно большим пальцем, насадка находится между средним и указательным пальцами.  4. Направьте насадку в носовой ход, слегка наклонив флакон вперед. 5. Нажмите на распылительное устройство, распыляя	<i>Флакон с помповым дозирующим устройством с боковой кнопкой активации:</i> обеспечивает точное распределение спрея по поверхности слизистой оболочки полости носа, создавая облако мелкодисперсного спрея. Защитный колпачок имеет функцию защиты от вскрытия детьми и легок в обращении у пожилых людей. <i>Способ применения флакона с вертикальным помповым дозирующим устройством:</i> Перед первым использованием распылите спрей в воздух несколькими нажатиями до равномерного распределения препарата. Если спрей не использовался в течение нескольких дней или нет равномерного распределения, процедуру следует повторить. Если доза спрея введена не полностью, повторять введение не следует. Избегать попадания в глаза. 1. Тщательно прочистите нос.


Старая редакция	Новая редакция
препарат, и одновременно вдохните через нос.  6. Повторите для другого носового хода. 7. После применения следует очистить и высушить насадку перед тем, как закрыть её защитным колпачком. Одно впрыскивание (70 мкл) препарата Отривин Экспресс содержит 35 мкг оксиметазолина гидрохлорида.	2. Держите флакон вертикально, поддерживая дно большим пальцем, насадка находится между средним и указательным пальцами. 3. Направьте насадку в носовой ход, слегка наклонив флакон вперед. 4. Нажмите на распылительное устройство, распыляя препарат, и одновременно вдохните через нос. 5. После применения следует очистить и высушить насадку перед тем, как закрыть её защитным колпачком. Чтобы избежать возможного распространения инфекции, препарат должен использовать только один человек. Способ применения флакона с помповым дозирующим устройством с боковой кнопкой активации: Перед первым применением спрея нажать на помповое дозирующее устройство 7 раз. При дальнейшем использовании дополнительная активация дозирующего устройства не

Старая редакция	Новая редакция
	требуется. Если наблюдается неравномерное дозирование спрея или перерыв в использовании препарата составил более 7 дней, необходимо активировать дозирующее устройство, нажав на него 2 раза. Избегать попадания в глаза. 1. Тщательно прочистите нос. 2. Держите флакон вертикально, поместив большой палец на кнопку активации. 3. Во избежание образования капель встаньте прямо и вставьте насадку в носовой ход. 4. Нажмите на кнопку одним пальцем, распыляя препарат, и одновременно осторожно вдохните через нос. 5. После применения следует очистить и высушить насадку перед тем, как закрыть её защитным колпачком до слышимого щелчка. Чтобы избежать возможного распространения инфекции, препарат должен использовать только один человек.

Старая редакция	Новая редакция
	Одна доза (70 мкл) препарата Отривин Экспресс содержит 35 мкг оксиметазолина гидрохлорида.
Форма выпуска Спрей назальный дозированный, 35 мкг/доза; спрей назальный дозированный с ароматом ментола, 35 мкг/доза. <u>Первичная упаковка</u> Не менее 120 доз (10 мл) препарата во флаконе из ПВХ, снабженном дозирующим устройством с наконечником из полипропилена и защитным колпачком из полиэтилена. <u>Вторичная упаковка</u> Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. На вторичной упаковке допускается наличие контроля первого вскрытия.	Форма выпуска Спрей назальный дозированный, 35 мкг/доза; спрей назальный дозированный с ароматом ментола, 35 мкг/доза. <u>Первичная упаковка</u> Не менее 120 доз (10 мл) препарата во флаконе из ПВХ, снабженном вертикальным помповым дозирующим устройством или помповым дозирующим устройством с боковой кнопкой активации с наконечником из полипропилена и защитным колпачком из полиэтилена. Защитный колпачок для помпового дозирующего устройства с боковой кнопкой активации имеет функцию защиты от вскрытия детьми. На флакон наносят этикетку. <u>Вторичная упаковка</u> Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

С. 7

Старая редакция	Новая редакция
	На вторичной упаковке допускается наличие контроля первого вскрытия.



Менеджер по регистрации
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»

Е.Ю. Кашарина

15 13 49

