

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Парацетамол детский,
суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная], 120 мг/5 мл
ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 3 14 06 22

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 5 мл препарата: <i>действующее вещество:</i> парацетамол - 120 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> [целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия] - 50 мг, камедь ксантановая (ксантановая смола) - 7,5 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 5 мг, пропиленгликоль - 1 мг, сахара (сахар белый) - 1650 мг, глицерол (глицерин) - 630 мг, сорбитол (сорбит) - 1128,75 мг, ароматизатор апельсиновый или ароматизатор клубничный - 6,5 мг, вода очищенная - до 5 мл.	Состав на 5 мл препарата: <i>действующее вещество:</i> парацетамол - 120 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> [целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия] - 50 мг, камедь ксантановая (ксантановая смола) - 7,5 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 5 мг, пропиленгликоль - 1 мг, сахара (сахар белый) - 1650 мг, глицерол (глицерин) - 630 мг, сорбитол (сорбит) - 1128,75 мг, ароматизатор апельсиновый или ароматизатор клубничный - 6,5 мг, натрия гидроксида раствор 2,4 %* - до pH 6,0, вода очищенная - до 5 мл. *Натрия гидроксида раствор 2,4 % готовят из натрия гидроксида и воды очищенной.
Форма выпуска Суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная], 120 мг/5 мл. По 100 г или 150 г, или 200 г во флаконы из темного стекла. Один флакон с	Форма выпуска Суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная], 120 мг/5 мл. По 100 г или 150 г, или 200 г во флаконы из темного стекла 3 гидролитического класса,

Старая редакция	Новая редакция
инструкцией по применению и мерной ложкой или с мерным шприцем в пачке из картона.	укупоренные полимерными крышками или полимерными крышками с контролем вскрытия и защитой от вскрытия детьми. По 100 г во флаконы из темного стекла 2 гидролитического класса, укупоренные полимерными крышками или полимерными крышками с контролем вскрытия и защитой от вскрытия детьми. Под крышками располагается пластиковый адаптер для шприца. Комплектация с мерной ложкой не включает адаптера. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку. Один флакон вместе с инструкцией по применению и с мерным шприцем или с мерной ложкой помещают в пачку из картона.

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Лексредства"



Е.В. Толстова