ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РЕЛИФ

Регистрационный номер:
Торговое название: Релиф
Лекарственная форма: мазь для ректального и наружного применения
Состав:
Действующие вещества: печени акулы масло 3,0 % (3 мг/100 г), фенилэфрина гидрохлорид 0,25 % (0,25 г/100 г);
Вспомогательные вещества: масло минеральное, вазелин, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ланолин безводный, бензойная кислота, кукурузы масло, глицерол, ланолиновый спирт, парафин, вода очищенная, масло тимьяновое, витамин Е (альфа-токоферол), воск пчелиный белый.

Описание
Желтая мазь, не содержащая посторонних включений.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя

Код АТХ: С05АХ03

Фармакологические свойства
Масло печени акулы оказывает местное противовоспалительное, гемостатическое и ранозаживляющее действие.
Фенилэфрина гидрохлорид является α-адреномиметиком, оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экссудации, отечности тканей, зуда при геморрое.

Показания к применению
Наружный и внутренний геморрой, трещины заднего прохода, анальный зуд.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения.

С осторожностью
Артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, задержка мочи (гипертрофия предстательной железы), беременность, период лактации.

Способ применения и дозы
Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.
Взрослые и дети старше 12 лет:
снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожнения кишечника.

После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Мазь наносится также на кожу в области заднего прохода.

Побочное действие
Редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Из-за содержащегося фенилэфрина снижается действие гипотензивных лекарственных средств. При одновременном назначении с антидепрессантами – ингибиторами МАО возможно развитие гипертонического криза.

Особые указания
Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом.
В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу.
Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.

Форма выпуска
Мазь для ректального и наружного применения.
По 28,4 г в пластиковую тубу с крышкой из полипропилена. Тубу вместе с аппликатором и инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку, обтянутую полиэтиленовой пленкой.

Условия хранения
При температуре не выше 27 °С в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска
Без рецепта.

Производитель. Сагмел, Инк., Чикаго, США.
1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048, США.
Представительство в России:
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7
Тел.: (495) 937-40-73, 937-40-80 факс (495) 937-40-83

Зам. Управляющего Представительства
по медицинским вопросам И.В. Нефедова

Директор ИДКЭЛС С. В. Буданов