МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Релиф®

наименование лекарственного препарата

мазь для ректального и наружного применения 2,5 мг/г

лекарственная форма, дозировка

ФАМАР С.А., Греция

наименование производителя, страна

Изменение № 5

211118

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Отсутствует.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Достаточного опыта по применению препарата во время беременности нет. Возможно применение для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.
Способ применения и дозы Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Взрослые и дети старше 12 лет: снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожне-	**Способ применения и дозы** Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Взрослые и дети старше 12 лет: снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожне-

114601

Старая редакция	Новая редакция
ния кишечника. После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Мазь наносится также на кожу в области заднего прохода. **Побочное действие** Редко – аллергические реакции.	ния кишечника в течение 7-14 дней. После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Мазь наносится также на кожу в области заднего прохода. **Побочное действие** Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих фенилэфрин, в различных лекарственных формах. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата. *Нарушения со стороны иммунной системы* Аллергические реакции. *Общие расстройства и нарушения в месте введения* Раздражение по типу контактного дерматита в месте нанесения. *Нарушения со стороны эндокринной системы* Обострение гипертиреоза *Нарушения со стороны нервной системы* Тремор, бессонница, нервозность. *Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы* Аритмия, повышение артериального давления **Передозировка** Продолжительное или чрезмерное местное

Старая редакция	Новая редакция
	применение фенилэфрина могут привести к нарушениям со стороны нервной системы, например, нервозности Лечение: симптоматическое.
Отсутствует.	**Особые указания** Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом. В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу. Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО. Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание снижения их эффективности.
Особые указания Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом. В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу. Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.	**Влияние на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами** Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами.
Отсутствует.	

МЗ РФ ФГБУ НЦЭСМП ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Менеджер по регистрации Олейник Е.Ф.

АО «БАЙЕР» АО BAYER

114601