

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

РИМАНТАДИН АВЕКСИМА

(наименование лекарственного препарата)

таблетки 50 мг

(лекарственная форма, дозировка)

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия

(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Дата внесения Изменения с « 06 11 15 » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочные эффекты <i>со стороны пищеварительной системы:</i> сухость во рту, тошнота, рвота, потеря аппетита, боли в эпигастрии, метеоризм; <i>со стороны центральной нервной системы:</i> головная боль, головокружение, бессонница, неврологические реакции, нарушение концентрации внимания, сонливость, тревожность, повышенная возбудимость, усталость; <i>прочие:</i> гипербилирубинемия, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница).	Побочное действие <i>Со стороны сердечно-сосудистой системы:</i> тахикардия, сердечная недостаточность, блокада сердца, ощущение сердцебиения, артериальная гипертензия, нарушение мозгового кровообращения, потеря сознания. <i>Со стороны нервной системы:</i> бессонница, головокружение, головная боль, раздражительность, усталость, нарушение концентрации внимания, двигательные расстройства, сонливость, подавленное настроение, эйфория, гиперкинезия, тремор, галлюцинации, спутанность сознания, судороги. <i>Со стороны органов чувств:</i> шум в ушах, изменение или потеря обоняния. <i>Со стороны дыхательной системы:</i> одышка, бронхоспазм, кашель. <i>Со стороны желудочно-кишечного</i>

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка <i>Симптомы:</i> возбуждение, галлюцинации, аритмия. <i>Лечение:</i> промывание желудка, симптоматическая терапия: мероприятия для поддержания жизненно важных функций. Римантадин частично выводится при гемодиализе.	<i>тракта:</i> тошнота, рвота, потеря аппетита, сухость слизистой оболочки полости рта, боль в животе, диарея, диспепсия. <i>Со стороны кожи и подкожной клетчатки:</i> сыпь. <i>Прочие:</i> усталость. Передозировка <i>Симптомы:</i> возбуждение, галлюцинации, аритмия. В некоторых случаях, при превышении рекомендованной дозы наблюдаются: слезоточивость глаз и боль в глазах, учащенное мочеиспускание, лихорадка, запор, потливость, воспаление слизистой оболочки ротовой полости, сухость кожи. <i>Лечение:</i> промывание желудка, симптоматическая терапия: мероприятия для поддержания жизненно важных функций. Римантадин частично выводится при гемодиализе.



Генеральный директор
ОАО «Ирбитский химфармзавод»

Л.А. Солодухина

