МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Неосмектин®

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый] 3 г

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 170212 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	**Лекарственная форма:** порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый].
Состав на один пакетик: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический – 3,0 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,749 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин – 0,004 г.	**Состав на один пакетик:** порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,749 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин – 0,004 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апельсиновый]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор апельсиновый- 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [лимонный]: *активное вещество:* смектит

	диоктаэдрический – 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) -0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор лимонный- 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [малиновый]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор малиновый- 0,023 г.
Описание Порошок от желтовато - или серовато-белого цвета до серовато- или коричневато-желтого цвета с запахом ванилина.	**Описание** Порошок от желтовато - или серовато-белого цвета до серовато- или коричневато-желтого цвета с запахом ванили. *Описание приготовленной суспензии*: - *ванильная:* суспензия от желтовато- или серовато-белого цвета до серовато- или коричневато-желтого цвета с запахом ванили; - *апельсиновая:* суспензия от желтовато- или серовато-белого цвета до серовато- или коричневато-желтого цвета с апельсиново-ванильным запахом; - *лимонная:* суспензия от желтовато - или серовато-белого цвета до серовато- или коричневато-желтого цвета с лимонно-ванильным запахом; - *малиновая:* суспензия от желтовато- или серовато-белого цвета до серовато- или коричневато-желтого цвета с малиново-ванильным запахом.
Форма выпуска Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г. По 3,76 г препарата (3 г активного вещества) в термосвариваемые пакетики из материала комбинированного. По 1, 3, 5, 10, 20 или 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению в пакет полиэтиленовый или пачку из картона.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый] 3 г. По 3,76 г препарата (3 г активного вещества) в термосвариваемые пакетики из материала комбинированного. По 1, 3, 5, 10, 20 или 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению в пакет полиэтиленовый или пачку из картона.

Представитель
ОАО«Фармстандарт-Лексредства» Е.Н. Прилепина