МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СТРЕПТОЦИД

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Стрептоцид

Международное непатентованное название: сульфаниламид

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав.
Активное вещество:
Сульфаниламид (Стрептоцид) - 10 г
Вспомогательное вещество:
вазелин - 90 г

Описание: мазь белого или светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство, сульфаниламид

Код АТХ: [D06BA05]

Фармакологические свойства
Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii.

Показания к применению
В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I и II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, хроническая сердечная недостаточ-

95418

ность, тиреотоксикоз, почечно-печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Наружно. Мазь наносят непосредственно на пораженную поверхность или на марлевую салфетку; перевязки производят через 1 – 2 дня. Курс лечения 10 – 14 дней.

Побочное действие
Аллергические реакции; при длительном применении больших доз – системное действие: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, кристаллурия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия; при продолжительной передозировке – тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха.
Лечение: обильное питье, при случайном приеме внутрь – промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Особые указания
Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье.
При необходимости одновременно назначают противомикробные препараты внутрь.
При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат и назначить соответствующее лечение.
Преждевременное прекращение лечения препаратом может способствовать развитию устойчивых к сульфаниламидам штаммов микроорганизмов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводились. Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска
Мазь для наружного применения 10 %.
По 25 г в тубе алюминиевой.
Одна туба с инструкцией по применению помещена в пачку из картона.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.


95418


Производитель
ОАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

Юридический адрес и адрес для принятия претензий
ОАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, тел./факс: (8412) 57-72-49.

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» Болдов Д.В.







95418