

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Левомецетин Актитаб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг и 500 мг

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « » **26 04 16** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка содержит – хлорамфеникола – 250 мг или 500 мг. Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил), целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кросповидон, кальция стеарат, для дозировки 250 мг – опадрай II (серия 85) [спирт поливиниловый, макрогол, тальк, титана диоксид, алюминиевый лак на основе красителя индигокармина, железа оксид желтый], для дозировки 500 мг – опадрай II (серия 85) [спирт поливиниловый, макрогол, тальк, титана диоксид, алюминиевый лак на основе красителя индигокармина, железа	Состав <i>1 таблетка содержит:</i> <i>действующее вещество:</i> хлорамфеникол 250 мг/ 500 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 80,68 мг/ 161,36 мг, коповидон (коллидон VA-64) 7,22 мг/ 14,44 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 1,0 мг/ 2,0 мг, повидон 5,8 мг/ 11,6 мг, кросповидон 11,7 мг/ 23,4 мг, кальция стеарат 3,6 мг/ 7,2 мг; <i>вспомогательные вещества для оболочки:</i> Опадрай II 85F30695 голубой [спирт поливиниловый 4,0 мг/ 8,0 мг, макрогол 2,02 мг/ 4,04 мг,

Старая редакция	Новая редакция
оксид желтый]	талък 1,48 мг/ 2,96 мг, титана диоксид 2,36 мг/ 4,72 мг, алюминиевый лак на основе красителя индигокармина 0,127 мг/ 0,254 мг, железа оксид желтый 0,013 мг/ 0,026 мг].

Директор по регистрации



Г.У. Сетдекова