МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004743-150318
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИМИЦИКЛИМ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Цимициклим

Международное непатентованное или группировочное наименование: Цимицифуги даурской, цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав на 100 г препарата

Действующее вещество

Цимицифуги экстракт жидкий (1 : 5)* – 12 г
с содержанием суммы тритерпеновых агликонов
в пересчете на амирин 0,27 %

Вспомогательные вещества

Натрия сахаринат (сахарин натрий) – 0,05 г

Мяты перечной листьев масло (мяты перечной масло)	–	0,01 г
Этанол (спирт этиловый) 95 %	–	28,13 г
Вода очищенная	–	59,81 г

*Цимицифуги экстракт жидкий (1 : 5) получают из корневищ с корнями цимицифуги даурской – Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. или цимицифуги кистевидной – Cimicifuga racemosa L. Nutt.; экстрагент – спирт этиловый 50 %, соотношение сырье : конечный экстракт – 1 : 5.

Описание

Жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Противоклимактерическое средство растительного происхождения.

Код АТХ

[G02CX].

Фармакологические свойства

Обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему, способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов недомогания в климактерический период. Терапевтический эффект наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели лечения.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Вегето-сосудистые расстройства в период менопаузы, пре- и постменопаузы («приливы», повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменения настроения, апатия и др.) в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, алкоголизм, эстроген-зависимые опухоли, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Нарушение функции печени, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 30 капель 2 раза в день в одно и то же время суток (утром и вечером).

Длительность лечения определяется врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

В редких случаях возможно появление боли в эпигастральной области и увеличение массы тела. Очень редко появляются чувство напряжения в молочных железах и менструальноподобные кровотечения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу****.*

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

В случае передозировки жалобы на боли в эпигастральной области могут быть более выраженные. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев.

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При изменении характера менструального цикла (нарушение или возобновление менструаций), а также при продолжительных или других вновь возникающих жалобах необходимо обратиться к врачу.

Препарат содержит от 35,0 до 40,0 % спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта (этанола) составляет около 0,48 г, в максимальной суточной дозе – около 0,96 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 25 или 50 мл во флаконы-капельницы темного стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми или крышками с капельницей. По 25, 50 или 100 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми, или крышками винтовыми, или крышками с капельницей. Каждый флакон-капельницу или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ» _____ С.А. Постельников
подпись ФИО