

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛСР-000089-170114

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Цераксон®

раствор для приема внутрь 100 мг/мл





Феррер Интернасьональ, С.А., Испания



Изменение № 3

Дата внесения Изменения « » 17 01 14 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Цераксон® раствор для приема внутрь назначается перорально. Перед применением препарат можно развести в небольшом количестве воды (120 мл или ½ стакана). Принимают во время еды или между приемами пищи. <u>Рекомендуемый режим дозирования</u> <i>Острый период ишемического инсульта и черепно-мозговой травмы (ЧМТ):</i> 1000 мг (10 мл или 1 пакетик) каждые 12 ч. Длительность лечения не менее 6 недель.	Способ применения и дозы Цераксон® раствор для приема внутрь назначается перорально. Перед применением препарат можно развести в небольшом количестве воды (120 мл или ½ стакана). Принимают во время еды или между приемами пищи. <u>Рекомендуемый режим дозирования</u> <i>Острый период ишемического инсульта и черепно-мозговой травмы (ЧМТ):</i> 1000 мг (10 мл или 1 пакетик) каждые 12 ч. Длительность лечения не менее 6 недель.

Старая редакция	Новая редакция
<i>Восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов, восстановительный период ЧМТ, когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга:</i> 500-2000 мг в день (5-10 мл 1-2 раза в день или 1 пакетик (1000 мг) 1-2 раза в день). Дозировка и длительность лечения в зависимости от тяжести симптомов заболевания. <u>Пожилые пациенты</u> При назначении препарата Цераксон® пожилым пациентам коррекции дозы не требуется. <i>Инструкция по использованию прилагаемого к флакону дозировочного шприца:</i> 1. Поместить дозировочный шприц во флакон (поршень шприца полностью опущен). 2. Осторожно потянуть за поршень дозировочного шприца, пока уровень раствора не сравняется с соответствующей отметкой на шприце.	<i>Восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов, восстановительный период ЧМТ, когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга:</i> 500-2000 мг в день (5-10 мл 1-2 раза в день или 1 пакетик (1000 мг) 1-2 раза в день). Дозировка и длительность лечения в зависимости от тяжести симптомов заболевания. <u>Пожилые пациенты</u> При назначении препарата Цераксон® пожилым пациентам коррекции дозы не требуется. <i>Инструкция по использованию прилагаемого к флакону дозировочного шприца:</i> 1. Поместить дозировочный шприц во флакон (поршень шприца полностью опущен). 2. Осторожно потянуть за поршень дозировочного шприца, пока уровень раствора не сравняется с соответствующей отметкой на шприце.

Старая редакция	Новая редакция
3. Перед приемом нужное количество раствора можно развести в $\frac{1}{2}$ стакана воды (120 мл).  После каждого использования, рекомендуется промывать дозировочный шприц водой. <i>Рекомендации по применению препарата Цераксон® в пакетиках:</i> 1. Отделить один пакетик от другого по отрывному шву. Придерживая пакетик вертикально, осторожно оторвать его край по отметке «Открывать здесь».  2. Содержимое пакетика можно выпить непосредственно после вскрытия	3. Перед приемом нужное количество раствора можно развести в $\frac{1}{2}$ стакана воды (120 мл).  После каждого использования, рекомендуется промывать дозировочный шприц водой. <i>Рекомендации по применению препарата Цераксон® в пакетиках:</i> 1. Придерживая пакетик вертикально, осторожно оторвать его край по отметке «Открывать здесь».  2. Содержимое пакетика можно выпить непосредственно после вскрытия

Старая редакция	Новая редакция
 или перед приемом можно развести в $\frac{1}{2}$ стакана воды (120 мл). 	 или перед приемом можно развести в $\frac{1}{2}$ стакана воды (120 мл). 
Форма выпуска Раствор для приема внутрь 100 мг/мл. 30 мл препарата во флаконе из бесцветного прозрачного стекла, укупоренного заворачивающейся пластиковой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Флакон вместе с дозировочным шприцем и инструкцией по применению помещают в картонную пачку, имеющую внутри перегородки. 10 мл препарата в пакетике из комбинированного материала	Форма выпуска Раствор для приема внутрь 100 мг/мл. 30 мл препарата во флаконе из бесцветного прозрачного стекла, укупоренного заворачивающейся пластиковой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Флакон вместе с дозировочным шприцем и инструкцией по применению помещают в картонную пачку, имеющую внутри перегородки. 10 мл препарата в пакетике из комбинированного материала

Старая редакция	Новая редакция
(полиэтилентерефталат/полистирол/ /алюминиевая фольга/полимерная пленка Сурлин). 6 или 10 пакетиков, скрепленных по два отрывным швом, вместе инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	(полиэтилентерефталат/полистирол/ /алюминиевая фольга/полимерная пленка Сурлин). 6 или 10 пакетиков вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Владелец регистрационного удостоверения Раздел отсутствует.	Владелец регистрационного удостоверения Феррер Интернасьональ, С.А., Испания Ferrer Internacional, S.A., Spain <i>Юридический адрес:</i> Гран Виа Карлос III, 94, 08028 Барселона, Испания Ferrer Internacional, S.A., Gran Via Carlos III, 94, 08028 Barcelona, Spain
Производитель Феррер Интернасьональ, С.А. Гран Виа Карлос III, 94, 08028 Барселона, Испания Ferrer Internacional, S.A., Gran Via Carlos III, 94, 08028 Barcelona, Spain	Производитель Феррер Интернасьональ, С.А., Испания Ferrer Internacional, S.A., Spain <i>Адрес производственной площадки:</i> Хуан Бускалья, 1-9, 08173 Сант Кугат- дел-Вальес, Барселона, Испания Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain

Старая редакция	Новая редакция
Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ» 119048 г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр.1 тел.: (495) 933 55 11, факс: (495) 502 16 25 адрес в Интернете: www.nycomed.ru электронная почта: russia@nycomed.com	Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Такеда Фармасьютикалс» 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 Телефон: +7 (495) 933 55 11 Факс: +7 (495) 502 16 25 адрес в Интернете: www.takeda.com.ru электронная почта: russia@takeda.com

Представитель

ООО «Такеда Фармасьютикалс»



В.М. Симакова