

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Элеутерококка экстракт жидкий

Регистрационный номер

ЛСР-000475/09

Торговое наименование

Элеутерококка экстракт жидкий

Международное непатентованное или группировочное наименование

Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт

Лекарственная форма

Экстракт для приема внутрь

Состав

Для получения препарата необходимо:

Элеутерококка колючего корневищ и корней - 1000 г

Этанола (спирта этилового) 40 % - достаточное количество для получения 1000 мл

Описание

Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом, возможна легкая опалесценция. При хранении возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа: Общетонизирующее средство растительного происхождения

Код АТХ: A13A

Фармакологические свойства

Препарат оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма, способствует улучшению аппетита, повышению физической и умственной работоспособности.

Показания к применению

Умственное и физическое переутомление, астенические состояния различной этиологии, артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечного ритма, инфаркт миокарда, церебрально-сосудистая патология, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь до еды в первой половине дня. Взрослым назначают по 20-30 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 2-3 раза в день. Детям старше 12 лет - в дозе из расчета по 1 капле на 1 год жизни. Курс лечения 25-30 дней.

При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Перед применением взбалтывать.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, бессонница, гипогликемия, тахикардия, головная боль. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

щите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие стимуляторов нервной системы и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин), является физиологическим антагонистом лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, анксиолитиков, противосудорожных лекарственных средств). При одновременном применении с дигоксином возможно повышение концентрации в плазме крови последнего; с гипогликемическими лекарственными средствами (в т.ч. инсулин) и антикоагулянтами возможно усиление эффекта.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Элеутерококка экстракт жидкий проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушений сна.

При явлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат.

Максимальная доза препарата (30 капель) содержит 0,43 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза (90 капель) содержит 1,4 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь.

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, закупоренные пробками из полиэтилена низкой плотности и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности.

По 50 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена низкой плотности и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности.

Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Начальник отдела регистрации
ЛС, БАД и ИМН



Н.В. Матрина